

**Verzeichnis der
Kontrollbetriebe
für Kartoffeln**

Ausgabe 01.01.2026

Die aktuelle Liste ist
auf www.kartoffel.ch
verfügbar.

**Liste des
entreprises contrôlées
pour les pommes de terre**

Version 01.01.2026

La liste actuelle
est disponible sur
www.patate.ch

Adresse	swisspatat Belpstrasse 26 3007 Bern
TEL	031 385 36 50
E-Mail	info@swisspatat.ch
Website	www.kartoffel.ch www.patate.ch



Kontrollbetriebe für Kartoffeln

Entreprises contrôlées pour les pommes de terre

Biscotte Fruits et Légumes SA	1184 Vinzel	021 824 00 70
Brönnimann Légumes	1845 Noville	021 960 15 05
Brunner KA-GE AG	8303 Bassersdorf	044 809 88 88
Egger Gemüsebau AG	8575 Bürglen	071 634 81 81
Feldhof Gemüse AG	9463 Oberriet	071 761 07 60
Inoverde fenaco société coopérative	1038 Bercher	058 434 06 31
Feuz frères SA	2735 Malleray	032 492 32 32
Hermann E. AG	7310 Bad Ragaz	081 302 11 89
Kellenberger Frisch Service frigemo AG	8005 Zürich	043 444 46 66
Lagerhaus Lohn Maison Virchaux AG	4573 Lohn	032 677 50 10
Lorenz Gross	2577 Finsterhennen	032 396 27 55
Müller Azmoos AG	9476 Weite	081 785 32 62
Schwab-Guillod AG	3225 Müntschemier	032 312 92 92
Seeland BIO Christen und Götschi	3215 Büchslen	031 751 17 10
SGG Waser AG	8952 Schlieren	044 755 77 22
Inoverde Steffen-Ris	3315 Bätterkinden	058 434 06 91
Inoverde Steffen-Ris	8500 Frauenfeld	058 424 18 18
Stoll frères SA	1400 Yverdon-les-Bains	024 447 35 35
Terralog ag	3422 Rüdltigen-Alchenflüh	058 252 10 10
Terraviva ag/sa	3210 Kerzers	031 750 57 50
TIOR SA	6593 Cadenazzo	091 850 29 06
UMG Union Maraîchère de Genève	1258 Perly-Certoux	022 827 40 00

1. Hauptsortenliste
 Liste principale

Sorte Variété	Verwendung / Utilisation				
	Speisesorten Variétés de table			Veredlungssorten Variétés de transformation	
	früh précoces	festkochend chair ferme	mehligkochend chair farineuse	Frites	Chips
Acoustic			X		
Agata	X				
Agria			X	X	
Amandine		X			
Amora				X	
Annabelle		X			
Aubaine *		X			
Austin					X
Ballerina		X			
Belmonda			X		
Beyonce					X
Celtiane		X			
Charlotte		X			
Colomba *	X				
Concordia			X		
Désirée			X		
Ditta		X			
Emanuelle		X			
Erika		X			
Favola					X
Fineline *		X			
Fontane				X	
Francis				X	
Gwenne		X			
Innovator				X	
Ivory Russet				X	
Jazzy *		X			
Jelly			X		
Lady Christl	X				
Lady Claire					X
Lady Jane				X	
Lady Rosetta					X
Laura			X		
Lucera *		X			
Lutine *		X			
Maldiva *		X			
Markies				X	
Odysseus					X
Otolia *			X		
Pirol					X
Queen Anne		X			
SH C 1010					X
Simonetta		X			
Sorentina					X
Sound			X		
Sunshine		X			
Thalessa					X
Twinner	X				
Twister *			X		
Venezia		X			
Victoria			X		
Vitabella *		X			

* Sortenblatt fehlt, da keine vergleichbaren Resultate (Aufnahme aufgrund privater Sortenversuche)
 La fiche variétale manque, car il n'existe pas de résultats comparables (admission sur la base d'essais variétaux privés).

2. Nebensortenliste
Liste secondaire

Sorte Variété	Verwendung / Utilisation		
	Speisesorten Variétés de table	Veredlungssorten Variétés de transformation	
		Frites	Chips
Avanti	X		
Babylon		X	
Baby Lou	X		
Belana	X		
Bintje	X		
Blaue St. Galler	X		
Challenger	X		
Cheyenne	X		
Donata		X	
El Mundo	X		
Ivetta	X		
Jule	X		
Levante	X		
Lugano		X	
Maiwen	X		
Marabel	X		
Melody	X		
Mulberry Beauty	X		
Nofy			X
Oscar	X		
Princess	X		
Ratte	X		
Rissoletto		X	
Sunita	X		

Acoustic

Autoren: Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche und Patrice de Werra
Gemeinsames Werk von Agroscope, swissem in Delley und der swisspatat in Bern

November 2022

Auteurs: Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche et Patrice de Werra
Œuvre commune d'Agroscope, de swissem à Delley et de swisspatat à Berne

Novembre 2022

Kartoffeln		Pommes de terre
Speisesorte		Variété de consommation
Reifegruppe	mittelfrüh / mi-précoce	Maturité
Züchter	Meijer (NL)	Obtenteur
Abstammung	Orchestra × DOB1997-507-0185	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2023	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	swissem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband / Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	kurzoval
	Grösse:	mittel
	Augen:	mittelflach bis flach
	Fleischfarbe:	hellgelb
	Schale:	gelb
Stängel	mittelhoch, aufrecht, nicht pigmentiert	
Blatt	grün	
Blüten	weiss, wenigblühend	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme:	oblongue courte
	taille:	moyenne
	yeux:	mi-superficiels à superficiels
	chair:	jaune clair
	peau:	jaune
Tige	taille moyenne, dressée, sans pigmentation	
Feuille	vert franc	
Fleur	blanche, peu	

Acoustic

2. Werteigenschaften	
Ertrag	hoch
Kalibrierausbeute	hoch
Stärkegehalt	mittel (10–13 %)
Stärkeertrag	gering
Kochtyp	B
Verfärbungen	roh: mittel gekocht: mittel
Reduzierende Zucker	
Verarbeitungseignung	keine

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques	
Rendement	élevé
Calibre commercial	élevé
Teneur en amidon	moyenne (10–13 %)
Rendement amidon	faible
Type culinaire	B
Altération de la couleur	chair crue: moyenne chair cuite: moyenne
Sucres réducteurs	
Utilisation technologique	néant

3. Anfälligkeiten	
Krebs	resistent
Nematoden	resistent (Ro ₁)
Krautfäule	sehr wenig
Knollenfäule	sehr wenig
Flachschorf	mittel
Pulverschorf	mittel
Eisenfleckigkeit	gering
Blattroll	gering
Virus Y	mittel
Schlagempfindlichkeit	gering

3. Sensibilités	
Galle verruqueuse	résistante
Nématodes	résistante (Ro ₁)
Mildiou des fanes	très faible
Mildiou des tubercules	très faible
Gale commune	moyenne
Gale poudreuse	moyenne
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	faible
Virus Y	moyenne
Sensibilité aux chocs	faible

4. Besondere Hinweise
Die Knollen haben eine mittlere Keimruhe. Sie ergrünen am Licht rasch.

4. Remarques particulières
Les tubercules ont une dormance moyenne. Ils sont sensibles au verdissement.

Acoustic ist eine mittelfrühe,
ziemlich festkochende Sorte.
Sie hat eine gute Krautfäuleresistenz.

Acoustic est une variété mi-précoce,
plutôt ferme et
très peu sensible au mildiou.

Impressum

Herausgeber
Auskünfte

Agroscope, www.agroscope.ch
Ruedi Schwärzel, Agroscope,
ruedi.schwaerzel@agroscope.admin.ch

Redaktion
Gestaltung
Fotos
Copyright

Andrea Leuenberger, Agroscope
Christoph Meichtry, Valmedia AG, Visp
Carole Parodi, Agroscope
© Agroscope 2022

Kartoffeln

Speisesorte

Reifegruppe

Züchter

Abstammung

Aufnahme
in die Sortenliste

Vertreter

Agata

sehr früh/*très précoce*

W. Weibull BV/Agrico,
NL-8300 AB Emmeloord

BM 52-72 x Sirco

2001

Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/
*Association suisse des producteurs
de semences*
CH-1567 Delley

Pommes de terre

Variété de consommation


Maturité

Obtenteur

Ascendance

*Inscription
sur la liste suisse*

Représentant



1. Morphologische Merkmale

Knolle: Form: kurzoval bis langoval
 Grösse: mittelgrossfallend
 Augen: flach bis mittelflach
 Fleischfarbe: gelb bis hellgelb
 Schale: gelb

Stängel: mittelhoch, deckend,
 sehr leicht pigmentiert

Blatt: grün bis hellgrün, mittelgross

Blüten: weiss, sehr selten blühend

1. Caractères morphologiques

Tubercule: forme: oblongue courte à oblongue
 taille: moyenne
 yeux: superficiels
 à mi-superficiels
 chair: jaune à jaune clair
 peau: jaune

Tige: de taille mi-haute, port étalé,
 avec très légère pigmentation

Feuille: vert assez clair, moyennes folioles

Fleur: blanche, floraison très rare

2. Werteigenschaften

Ertrag:	hoch
Kalibrierbeute:	mittel
Stärkegehalt:	sehr niedrig (10-11%)
Stärkeertrag:	sehr niedrig
Kochtyp:	A - B
Verfärbung	
roh:	gering
gekocht:	sehr gering
Verarbeitungseignung:	keine

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement:	élevé
Calibre commercial:	moyen
Teneur en amidon:	très faible (10-11%)
Rendement amidon:	très faible
Type culinaire:	A - B
Altération de la couleur	
chair crue:	faible
chair cuite:	très faible
Utilisation technologique:	néant

3. Anfälligkeiten

Krebs:	nicht anfällig
Nematoden:	nicht anfällig (Pathotyp Ro ₁ + Ro ₄)
Krautfäule:	stark
Braunfäule:	mittel
Flachschorf:	mittel
Pulverschorf:	mittel
Eisenfleckigkeit:	gering
Blattroll:	mittel
Virus Y:	gering
Schlagempfindlichkeit:	gering
Abkeimungs-empfindlichkeit:	mittel

3. Sensibilités

Galle verruqueuse:	résistante
Nématodes:	résistante aux pathotypes Ro ₁ + Ro ₄
Mildiou des fanes:	élevée
Mildiou des tubercules:	moyenne
Gale commune:	moyenne
Gale poudreuse:	moyenne
Taches de rouille:	faible
Virus de l'enroulement:	moyenne
Virus Y:	faible
Sensibilité aux chocs:	faible
Sensibilité à l'égermage:	moyenne

4. Besondere Hinweise

Feinschalige, regelmässige Knollen. Sehr kurze Keimruhe.

4. Remarques particulières

Les tubercules ont une peau fine et sont d'une très belle présentation. La dormance est très courte.

Agata ist eine Frühsorte für den Frischkonsum.

Agata est une variété de consommation précoce.

Gemeinsames Werk der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten Reckenholz und Changins, des Schweizerischen Saatgutproduzenten-Verbandes Delley und der swisspatat in Bern.

Œuvre commune des Stations fédérales de recherches agronomiques de Changins et de Reckenholz, de l'Association suisse des producteurs de semences à Delley et de swisspatat à Berne.



Pomme de terre
Variété de consommation

Agria

Kartoffeln
Speisesorte

Maturité	mittelfrüh bis mittelspät <i>mi-précoce à mi-tardive</i>	Reifegruppe
Obtenteur	Kartoffelzucht Böhm AG Postfach 1968 D - 2120 Lüneburg	Züchter
Ascendance	Quarta x Semlo	Abstammung
Inscription sur la liste officielle	1988	Aufnahme in die offizielle Sortenliste
Représentant	Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband Ass. suisse des producteurs de semences CH - 1567 Delley	Vertreter



1.	Caractères morphologiques	1.	Morphologische Merkmale
Tubercule :	forme : oblong long à oblong court taille : grosse yeux : superficiels à mi-profonds chair : jaune foncé peau : jaune, légèrement réticulée	Knolle :	Form : langoval bis kurzoval Grösse : gross Augen : flach bis mitteltief Fleischfarbe : tiefgelb Schale : gelb, leicht genetzt
Tige :	taille moyenne, peu nombreuses, vigoureuses, aisselles violettes	Stengel :	mittelhoch, wenig zahlreich, kräftig, Achseln violett
Feuille :		Blatt :	matt, graugrün, gross
Fleur :	mate, gris-vert, grande blanche, floraison abondante	Blüten :	weiss, stark blühend

2.	Caractéristiques agronomiques et technologiques	2.	Werteigenschaften
Rendement : Calibre : Teneur en amidon : Rendement amidon : Type culinaire : Altération de la couleur - chair crue : - chair cuite : Sucres réducteurs (teneur): Utilisation technologique :	très élevé grand moyenne à faible (13 - 15,5%) moyen à élevé B-C faible faible très faible frites, rösti	Ertrag : Kalibrierausbeute : Stärkegehalt : Stärkeertrag : Kochtyp : Verfärbung - roh : - gekocht : Reduzierende Zucker : Verarbeitungseignung :	sehr hoch hoch mittel bis niedrig (13 - 15,5%) mittel bis hoch B-C gering gering sehr gering Frites, Rösti
3.	Sensibilité	3.	Anfälligkeiten
Galle verruqueuse : Nématodes : Mildiou des fanes : Mildiou des tubercules : Gale commune : Gale poudreuse : Taches de rouille : Sensibilité aux chocs : Virus de l'enroulement : Virus Y :	sensible pas sensible au pathotype Ro ₁ moyenne faible moyenne élevée moyenne à faible moyenne à faible moyenne faible	Krebs : Nematoden : Krautfäule : Braunfäule : Flachschorf : Pulverschorf : Eisenfleckigkeit : Schlagempfindlichkeit : Blattroll : Virus Y :	anfällig nicht anfällig (Pathotyp Ro ₁) mittel gering mittel stark mittel bis gering mittel bis gering mittel gering
4. Agria	Remarques particulières	4. Agria	Besondere Hinweise
	Réfractaire au virus X. Agria a une longue dormance. La durée d'incubation est courte. Modérer la fumure azotée!		Immun gegen Virus X. Agria ist sehr keimruhig. Die Inkubationsdauer ist kurz. Zurückhaltung bei Stickstoffdüngung!

Agria est une bonne variété qui produit de gros tubercules. Elle se consomme à l'état frais et se prête à la transformation par l'industrie alimentaire.

Agria ist eine gute, grossfallende Speisesorte für Frischkonsum und Verarbeitung.

Oeuvre commune des stations fédérales de recherches agronomiques de Changins et de Reckenholz, de l'Association suisse des producteurs de semences à Delley et de swisspatat à Guin.

Gemeinsames Werk der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten Reckenholz und Changins, des Schweizerischen Saatgutproduzenten-Verbandes Delley und der swisspatat in Düringen.

Pomme de terre
Variété de consommation

Amandine

Kartoffeln
Speisesorte

Maturité	früh précoce	Reifegruppe
Obtenteur	Germicopa F - 29334 Quimper Cedex	Züchter
Ascendance	Mariana X Charlotte	Abstammung
Inscription sur la liste suisse	1999	Aufnahme in die Sortenliste
Représentant	APPNAL Ass. suisse des Producteurs de Pommes de terre Nouvelles de l'Arc Lémanique CH - 1260 Nyon	Vertreter



1.	Caractères morphologiques	1.	Morphologische Merkmale
Tubercule :	forme : oblongue à longue taille : moyenne yeux : superficiels chair : jaune clair peau : jaune	Knolle :	Form : lang bis langoval Grösse : mittelgrossfallend Augen : flach Fleischfarbe : hellgelb Schale : gelb
Tige :	taille moyenne, port mi-dressé, avec légère pigmentation	Stengel :	mittelhoch, mittelaufrecht, leicht pigmentiert
Feuille :	vert foncé, petites folioles brillantes	Blatt :	dunkelgrün, kleine Blättchen glänzend
Fleur :	grande, mauve dégradé crème, floraison très rare	Blüten :	gross, hellblau-lila farbig, sehr selten blühend

2.	Caractéristiques agronomiques et technologiques	2.	Werteigenschaften
Rendement : Calibre commercial: Teneur en amidon : Rendement amidon : Type culinaire : Altération de la couleur - chair crue : - chair cuite : Utilisation technologique :	moyen à faible faible faible (10,5 - 12%) faible A-B faible faible néant	Ertrag : Kalibriererausbeute : Stärkegehalt : Stärkeertrag : Kochtyp : Verfärbung - roh : - gekocht : Verarbeitungseignung :	mittel bis gering gering niedrig (10,5 - 12%) niedrig A-B gering gering keine
3.	Sensibilités	3.	Anfälligkeiten
Galle verruqueuse : Nématodes : Mildiou des fanes : Mildiou des tubercules : Gale commune : Gale poudreuse : Taches de rouille : Virus de l'enroulement : Virus Y : Sensibilité aux chocs : Sensibilité à l'égermage :	résistante sensible moyenne à assez élevée moyenne à assez élevée faible faible faible moyenne élevée moyenne élevée	Krebs : Nematoden : Krautfäule : Braunfäule : Flachschorf : Pulverschorf : Eisenfleckigkeit : Blattroll : Virus Y : Schlagempfindlichkeit : Abkeimungsempfindlichkeit :	nicht anfällig anfällig mittel bis ziemlich stark mittel bis ziemlich stark gering gering gering mittel stark mittel hoch
4.	Remarques particulières	4.	Besondere Hinweise
	La dormance est très courte.		Sehr kurze Keimruhe.

Amandine est une excellente variété de consommation à chair fine et ferme.

Amandine ist eine gute Speisesorte mit festem und feinem Knollenfleisch

Oeuvre commune des Stations fédérales de recherches agronomiques de Changins et de Reckenholz, de l'Association suisse des producteurs de semences à Delley et de swisspatat à Guin.

Gemeinsames Werk der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten Reckenholz und Changins, des Schweizerischen Saatgutproduzenten- Verbandes Delley und der swisspatat in Düringen.

Amora

Autorinnen und Autoren

Mout De Vrieze, Benjamin Hauser, Leonardo Piva,
Christian Vetterli, Patrice de Werra

Gemeinsames Werk von Agroscope,
swissem in Delley und der swisspatat in Bern

Dezember 2025

Autrices et auteurs

Mout De Vrieze, Benjamin Hauser, Leonardo Piva,
Christian Vetterli, Patrice de Werra

Œuvre commune d'Agroscope,
swissem à Delley et de swisspatat à Bern

Décembre 2025

Kartoffeln		Pommes de terre
Verarbeitungssorte		Variété pour l'industrie alimentaire
Reifegruppe	früh / précoce	Maturité
Züchter	Schaap Holland (NL)	Obtenteur
Abstammung	Premiere x Anosta	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2026	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	swissem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband / Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	kurzoval bis langoval
	Grösse:	mittel bis gross
	Augen:	mittelflach
	Fleischfarbe:	hellgelb
	Schale:	gelb
Stängel	hoch, aufrecht, nicht pigmentiert	
Blatt	dunkelgrün	
Blüten	weiss	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme:	oblongue courte à oblongue
	taille:	moyenne à grosse
	yeux:	mi-superficiels
	chair:	jaune clair
	peau:	jaune
Tige	taille haute, dressée, sans pigmentation	
Feuille	vert foncé	
Fleur	blanche	

Amora

2. Werteigenschaften	
Ertrag	hoch bis sehr hoch
Kalibrierbeute	hoch
Stärkegehalt	mittel (11–16 %)
Stärkeertrag	mittel
Kochtyp	C–B
Verfärbungen	roh: mittel gekocht: mittel
Reduzierende Zucker	keine Information vorhanden
Verarbeitungseignung	Frites

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques	
Rendement	élevé à très élevé
Calibre commercial	élevé
Teneur en amidon	moyenne (11–16 %)
Rendement amidon	moyen
Type culinaire	C–B
Altération de la couleur	chair crue: moyenne chair cuite: moyenne
Sucres réducteurs	pas d'information disponible
Utilisation technologique	Frites

3. Anfälligkeiten	
Krebs	gering
Nematoden	Resistent (Ro ₁)
Krautfäule	mittel bis hoch
Knollenfäule	gering
Flachschorf	gering
Pulverschorf	gering
Eisenfleckigkeit	gering bis mittel
Blattroll	gering
Virus Y	mittel, Y ^{NTN} mittel
Schlagempfindlichkeit	hoch

3. Sensibilités	
Galle verruqueuse	faible
Nématodes	résistante (Ro ₁)
Mildiou des fanes	moyenne à élevée
Mildiou des tubercules	faible
Gale commune	faible
Gale poudreuse	faible
Taches de rouille	faible à moyenne
Virus de l'enroulement	faible
Virus Y	moyenne, Y ^{NTN} moyenne
Sensibilité aux chocs	élevée

4. Besondere Hinweise
Für die Verarbeitung direkt nach der Ernte geeignet.

4. Remarques particulières
Adaptée pour la transformation en sortie de champ.

Amora

Amora

Impressum

Herausgeber Agroscope, www.agroscope.ch
 Auskünfte Mout De Vrieze, Agroscope
mout.devrieze@agroscope.admin.ch
 Redaktion Andrea Leuenberger, Agroscope
 Gestaltung Christoph Meichtry, Valmedia AG, Visp
 Fotos Carole Parodi, Mout De Vrieze, Agroscope
 Copyright © Agroscope 2025

Kartoffeln

Speisesorte
Reifegruppe

Züchter
Abstammung
Aufnahme in die Sortenliste

Vertreter

Annabelle

früh/précoce

HZPC B.V., NL-8500 AB Joure

Nicola x Monalisa


2008

swissem
Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/
Association suisse des producteurs
de semences
1567 Delley

Pommes de terre

Variété de consommation
Maturité

Obtenteur
Ascendance
Inscription
sur la liste suisse
Représentant



1. Morphologische Merkmale

Knolle	Form:	lang bis langoval
	Grösse:	mittel bis kleinfallend
	Augen:	flach bis mittelflach
	Fleischfarbe:	gelb
	Schale:	gelb
Stängel	mittelhoch, mittelaufrecht, leicht pigmentiert	
Blatt	grün bis hellgrün	
Blüten	weiss, klein, sehr selten blühend	

1. Caractères morphologiques

Tubercule	forme:	longue à oblongue
	taille:	moyenne à petite
	yeux:	superficiels à mi-superficiels
	chair:	jaune
	peau:	jaune
Tige	de taille moyenne, port mi-dressé, avec légère pigmentation	
Feuille	vert à vert clair	
Fleur	blanche, petite, floraison très rare	

2. Werteigenschaften

Ertrag:	mittel
Kalibrierungsbeute:	niedrig
Stärkegehalt:	niedrig (10-13%)
Stärkeertrag:	niedrig
Kochtyp:	A-B
Verfärbung	
roh:	mittel
gekocht:	gering
Reduzierende Zucker:	hoch
	(2,73% TS)
Verarbeitungseignung:	keine
Vorkeimdauer:	4 Wochen

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

<i>Rendement:</i>	<i>moyen</i>
<i>Calibre commercial:</i>	<i>faible</i>
<i>Teneur en amidon:</i>	<i>faible (10-13%)</i>
<i>Rendement amidon:</i>	<i>faible</i>
<i>Type culinaire:</i>	<i>A-B</i>
<i>Altération de la couleur</i>	
<i>chair crue:</i>	<i>moyenne</i>
<i>chair cuite:</i>	<i>faible</i>
<i>Sucres réducteurs</i>	<i>élevée</i>
<i>(teneur):</i>	<i>(2,73% MS)</i>
<i>Utilisation technologique:</i>	<i>néant</i>
<i>Prégermination:</i>	<i>4 semaines</i>

3. Anfälligkeiten

Krebs:	nicht anfällig
Nematoden:	nicht anfällig
	Pathotyp Ro ₁ bis Ro ₃
Krautfäule:	hoch
Braunfäule:	mittel
Flachschorf:	mittel
Pulverschorf:	gering bis mittel
Eisenfleckigkeit:	gering
Blattroll:	gering
Virus Y:	mittel
Virus Y ^{NTN} :	anfällig
Schlagempfindlichkeit:	gering
Abkeimungs-empfindlichkeit:	hoch

3. Sensibilités

<i>Galle verruqueuse:</i>	<i>résistante</i>
<i>Nématodes:</i>	<i>résistante</i>
	<i>aux pathotypes Ro₁ à Ro₃</i>
<i>Mildiou des fanes:</i>	<i>élevée</i>
<i>Mildiou des tubercules:</i>	<i>moyenne</i>
<i>Gale commune:</i>	<i>moyenne</i>
<i>Gale poudreuse:</i>	<i>faible à moyenne</i>
<i>Taches de rouille:</i>	<i>faible</i>
<i>Virus de l'enroulement:</i>	<i>faible</i>
<i>Virus Y:</i>	<i>moyenne</i>
<i>Virus Y^{NTN}:</i>	<i>sensible</i>
<i>Sensibilité aux chocs:</i>	<i>faible</i>
<i>Sensibilité à l'égermage:</i>	<i>élevée</i>

4. Besondere Hinweise

Annabelle hat eine sehr kurze Keimruhe.

4. Remarques particulières

Annabelle a une dormance très courte.

Annabelle ist eine frühabreifende, festkochende Speisesorte mit guter äusserer Knollenqualität.

Annabelle est une excellente variété de consommation à chair ferme de type précoce.

Austin

Autoren: Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche und Patrice de Werra
Gemeinsames Werk von Agroscope, swisssem in Delley und der swisspatat in Bern

November 2023

Auteurs: Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche et Patrice de Werra
Œuvre commune d'Agroscope, de swisssem à Delley et de swisspatat à Berne

Novembre 2023

Kartoffeln		Pommes de terre
Verarbeitungssorte		Variété pour l'industrie alimentaire
Reifegruppe	mittelfrüh / mi-précoce	Maturité
Züchter	Interseed (D)	Obtenteur
Abstammung	Albata × Miss Bianca	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2023	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	swisssem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband / Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	kurzoval
	Grösse:	mittel
	Augen:	mittelflach
	Fleischfarbe:	gelb
	Schale:	gelb
Stängel	mittelhoch, mitteldeckend, leicht pigmentiert	
Blatt	mittelgrün	
Blüten	hellblau-lila farbig, stark blühend	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme:	oblongue courte
	taille:	moyenne
	yeux:	mi-superficiels
	chair:	jaune
	peau:	jaune
Tige	taille moyenne, mi-étalée avec légère pigmentation	
Feuille	vert franc	
Fleur	mauve, abondante	

Austin

2. Werteigenschaften	
Ertrag	mittel
Kalibrierausbeute	hoch
Stärkegehalt	hoch (16–18 %)
Stärkeertrag	hoch
Kochtyp	C–D
Verfärbungen	roh: wenig gekocht: mittel
Reduzierende Zucker	mittel
Verarbeitungseignung	Chips

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques	
Rendement	moyen
Calibre commercial	élevé
Teneur en amidon	élevée (16–18 %)
Rendement amidon	élevé
Type culinaire	C–D
Altération de la couleur	chair crue: faible chair cuite: moyenne
Sucres réducteurs	moyens
Utilisation technologique	chips

3. Anfälligkeiten	
Krebs	resistent
Nematoden	resistent (Ro ₁ , Ro ₄ , Ro ₍₉₎)
Krautfäule	hoch
Knollenfäule	hoch
Flachschorf	mittel
Pulverschorf	mittel
Eisenfleckigkeit	mittel
Blattroll	gering
Virus Y	gering
Schlagempfindlichkeit	hoch

3. Sensibilités	
Galle verruqueuse	résistante
Nématodes	résistante (Ro ₁ , Ro ₄ , Ro ₍₉₎)
Mildiou des fanes	élevée
Mildiou des tubercules	élevée
Gale commune	moyenne
Gale poudreuse	moyenne
Taches de rouille	moyenne
Virus de l'enroulement	faible
Virus Y	faible
Sensibilité aux chocs	élevée

4. Besondere Hinweise
Die Keimruhe ist kurz. Austin weist eine schlechte Lagereignung auf.

4. Remarques particulières
La dormance est courte. Austin ne se conserve pas.

Austin ist eine mittelfrühe Chipssorte mit guter Backeignung.


Austin est une variété chips, mi-précoce, avec de bonnes aptitudes à la cuisson.

Impressum

Herausgeber	Agroscope, www.agroscope.ch
Auskünfte	Ruedi Schwärzel, Agroscope, ruedi.schwaerzel@agroscope.admin.ch
Redaktion	Andrea Leuenberger, Agroscope
Gestaltung	Christoph Meichtry, Valmedia AG, Visp
Fotos	Carole Parodi, Agroscope
Copyright	© Agroscope 2023

Ballerina

Kartoffeln		Pommes de terre
Speisesorte		Variété de consommation
Reifegruppe	mittelfrüh / mi-précoce	Maturité
Züchter	Vandel (DK), NSP (D)	Obtenteur
Abstammung	Agria × Obelix	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2020	Inscription dans la liste suisse
Vertreter	swisssem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband / Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form	langoval
	Grösse	eher grossfallend
	Augen	flach
	Fleischfarbe	gelb
	Schale	gelb
Stängel	mittelhoch, mitteldeckend, ohne Pigmentierung	
Blatt	klein lanzettförmig, grün	
Blüten	cremefarben, mittel- bis schwachblühend	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme	oblongue
	taille	plutôt grande
	yeux	superficiels
	chair	jaune clair
	peau	jaune
Tige	de taille moyenne, mi-étalée, sans pigmentation	
Feuille	petite lancéolée, vert franc	
Fleur	crème, rare à moyenne	

Ballerina

2. Werteigenschaften

Ertrag	mittel bis hoch
Kalibrierungsbeute	hoch
Stärkegehalt	niedrig (10–12 %)
Stärkeertrag	niedrig
Kochtyp	B–A
Verfärbungen	roh: mittel gekocht: mittel
Reduzierende Zucker	mittel
Verarbeitungseignung	keine
Vorkeimdauer	4–5 Wochen
Frühkartoffel	10–12 Wochen

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement	moyen à élevé
Calibre commercial	élevé
Teneur en amidon	faible (10–12 %)
Rendement amidon	faible
Type culinaire	B–A
Altération de la couleur	chair crue: moyenne chair cuite: moyenne
Taux de sucres réducteurs	moyen
Utilisation technologique	néant
Prégermination	4–5 semaines
Primeur	10–12 semaines

3. Anfälligkeiten

Krebs	nicht anfällig 1
Nematoden	anfällig
Krautfäule	hoch
Knollenfäule	mittel
Flachschorf	gering
Pulverschorf	gering
Eisenfleckigkeit	gering
Blattroll	gering
Virus Y	hoch
Schlagempfindlichkeit	gering

3. Sensibilités

Galle verruqueuse	résistante 1
Nématodes	sensible
Mildiou des fanes	élevé
Mildiou des tubercules	moyenne
Gale commune	faible
Gale poudreuse	faible
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	faible
Virus Y	élevé
Sensibilité aux chocs	faible

4. Besondere Hinweise

Die Knollen sind keimruhg.
Sie ergrünen am Licht ziemlich rasch.

4. Remarques particulières


Ballerina a une bonne dormance.
Elle est assez sensible au verdissement.

Ballerina ist eine mittelfrühe, ziemlich festkochende Sorte.

Ballerina est une variété mi-précoce, assez ferme.

Belmonda

Kartoffeln		Pommes de terre
Speisesorte		Variété de consommation
Reifegruppe	mittelspät / mi-tardive	Maturité
Züchter	Solana (D)	Obtenteur
Abstammung	Marabel × Leyla	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2020	Inscription dans la liste suisse
Vertreter	swisssem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband / Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form	kurzoval bis langoval
	Grösse	eher grossfallend
	Augen	flach, z. T. rötlich
	Fleischfarbe	gelb
	Schale	gelb
Stängel	hoch, mitteleckend, ohne Pigmentierung	
Blatt	mittel, grün bis hellgrün	
Blüten	lilafarbig, mittel- bis schwachblühend	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme	oblongue courte à oblongue
	taille	plutôt grande
	yeux	superficiels, parfois rougeâtres
	chair	jaune
	peau	jaune
Tige	de taille haute, mi-étalée, sans pigmentation	
Feuille	moyen, vert franc à clair	
Fleur	mauve, rare à moyenne	

Belmonda

2. Werteigenschaften

Ertrag	hoch
Kalibrierungsbeute	hoch
Stärkegehalt	mittel (14–16 %)
Stärkeertrag	mittel
Kochtyp	B
Verfärbungen	roh: gering gekocht: gering
Reduzierende Zucker	hoch
Verarbeitungseignung	keine
Vorkeimdauer	4–5 Wochen

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement	élevé
Calibre commercial	élevé
Teneur en amidon	moyenne (14–16 %)
Rendement amidon	moyen
Type culinaire	B
Altération de la couleur	chair crue: faible chair cuite: faible
Taux de sucres réducteurs	élevé
Utilisation technologique	néant
Prégermination	4–5 semaines

3. Anfälligkeiten

Krebs	nicht anfällig 1
Nematoden	nicht anfällig (Ro _{1,4})
Krautfäule	mittel
Knollenfäule	mittel
Flachschorf	gering
Pulverschorf	mittel
Eisenfleckigkeit	gering bis mittel
Blattroll	gering
Virus Y	hoch (etwas Y ^{NTN})
Schlagempfindlichkeit	gering bis mittel

3. Sensibilités

Galle verruqueuse	résistante 1
Nématodes	résistante (Ro _{1,4})
Mildiou des fanes	moyenne
Mildiou des tubercules	moyenne
Gale commune	faible
Gale poudreuse	moyenne
Taches de rouille	faible à moyenne
Virus de l'enroulement	faible
Virus Y	élevé (un peu Y ^{NTN})
Sensibilité aux chocs	faible à moyenne

4. Besondere Hinweise

Die Knollen sind keimruhig.
Die Sorte ist mittelanfällig auf ein Ergrünen der Knollen.

4. Remarques particulières

Belmonda a une bonne dormance.
Elle est moyennement sensible au verdissement.

Belmonda ist eine mittelspäte Sorte.

Belmonda est une variété mi-tardive.

Beyonce

Autorinnen und Autoren: Mout De Vrieze,
Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche
und Patrice de Werra
Gemeinsames Werk von Agroscope,
swissem in Delley und der swisspatat in Bern

November 2024

Auteurs et Autrices: Mout De Vrieze,
Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche
et Patrice de Werra
Œuvre commune d'Agroscope,
de swissem à Delley et de swisspatat à Berne

Novembre 2024

Kartoffeln		Pommes de terre
Verarbeitungssorte		Variété pour l'industrie alimentaire
Reifegruppe	mittelfrüh / mi-précoce	Maturité
Züchter	Agrico (NL)	Obtenteur
Abstammung	AR 94-2061 × Lady Jo	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2025	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	swissem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband / Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	rund bis kurzoval
	Grösse:	mittel
	Augen:	flach
	Fleischfarbe:	hellgelb bis gelb
	Schale:	hellgelb bis gelb
Stängel	mittelhoch, aufrecht, nicht pigmentiert	
Blatt	grün	
Blüten	violett	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme:	ronde à oblongue courte
	taille:	moyenne
	yeux:	superficiels
	chair:	jaune clair à jaune
	peau:	jaune clair à jaune
Tige	taille moyenne, dressée sans pigmentation	
Feuille	vert franc	
Fleur	violette	

Beyonce

2. Werteigenschaften	
Ertrag	hoch
Kalibrierbeute	mittel
Stärkegehalt	mittel (15–18 %)
Stärkeertrag	mittel
Kochtyp	B–C
Verfärbungen	roh: wenig gekocht: mittel
Reduzierende Zucker	hoch
Verarbeitungseignung	Chips

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques	
Rendement	élevé
Calibre commercial	moyen
Teneur en amidon	moyenne (15–18 %)
Rendement amidon	moyen
Type culinaire	B–C
Altération de la couleur	chair crue: faible chair cuite: moyenne
Sucres réducteurs	élevé
Utilisation technologique	chips

3. Anfälligkeiten	
Krebs	anfällig
Nematoden	anfällig
Krautfäule	sehr gering
Knollenfäule	gering
Flachschorf	mittel
Pulverschorf	hoch
Eisenfleckigkeit	mittel
Blattroll	gering
Virus Y	hoch, Y ^{NTN} mittel bis hoch
Schlagempfindlichkeit	mittel

3. Sensibilités	
Galle verruqueuse	sensible
Nématodes	sensible
Mildiou des fanes	très faible
Mildiou des tubercules	faible
Gale commune	moyenne
Gale poudreuse	élevée
Taches de rouille	moyenne
Virus de l'enroulement	faible
Virus Y	élevée, Y ^{NTN} moyenne à élevée
Sensibilité aux chocs	moyenne

4. Besondere Hinweise

4. Remarques particulières

Beyonce

Beyonce

Impressum

Herausgeber
Auskünfte


Agroscope, www.agroscope.ch
Mout de Vrieze, Agroscope,
mout.devrieze@agroscope.admin.ch

Redaktion
Gestaltung
Fotos
Copyright

Andrea Leuenberger, Agroscope
Christoph Meichtry, Valmedia AG, Visp
Carole Parodi, Mout de Vrieze, Agroscope
© Agroscope 2024

Celtiane

Kartoffeln		Pommes de terre
Speisesorte		Variété de consommation
Reifegruppe	früh bis mittelfrüh / précoce à mi-précoce	Maturité
Züchter	Bretagne Plants (F)	Obtenteur
Abstammung	Amandine x Eden	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2010	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	APPNAL Association des producteurs de pommes de terre nouvelles de l'arc lémanique CH-1260 Nyon	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	lang
	Grösse:	mittel
	Augen:	flach
	Fleischfarbe:	hellgelb
	Schale:	gelb
Stängel	mittelhoch, aufrecht bis mittelaufrecht	
Blatt	leicht glänzend, dunkelgrün	
Blüten	leicht violett, sehr selten blühend	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme:	longue
	taille:	moyenne
	yeux:	superficiels
	chair:	jaune clair
	peau:	jaune
Tige	taille moyenne, port dressé à mi-dressé	
Feuille	légèrement brillante, vert foncé	
Fleur	légèrement violacée, floraison très rare	

Celtiane

2. Werteigenschaften

Ertrag	hoch
Kalibrierausbeute	hoch
Stärkegehalt	mittel (11 – 14 %)
Stärkeertrag	mittel
Kochtyp	A – B
Verfärbungen	roh: gering gekocht: gering
Reduzierende Zucker	mittel hoch (2,34 % TS)
Verarbeitungseignung	keine
Vorkeimdauer	4–5; Primeur: 10–12 Wochen

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement	élevé
Calibre commercial	élevé
Teneur en amidon	moyenne (11 – 14 %)
Rendement amidon	moyen
Type culinaire	A – B
Altération de la couleur	chair crue: faible chair cuite: faible
Sucres réducteurs	assez élevé (2,34 % MS)
Utilisation technologique	néant
Prégermination	4–5; primeur: 10–12 semaines

3. Anfälligkeiten

Krebs	anfällig
Nematoden	nicht anfällig (Pathotypen Ro ₁ + Ro ₃)
Krautfäule	hoch
Braunfäule	hoch
Flachschorf	gering
Pulverschorf	mittel
Eisenfleckigkeit	gering
Blattroll	mittel
Virus Y	sehr anfällig
Schlagempfindlichkeit	mittel
Abkeimungsempfindlichkeit	anfällig

3. Sensibilités

Galle verruqueuse	sensible
Nématodes	résistante (aux pathotypes Ro ₁ + Ro ₃)
Mildiou des fanes	élevée
Mildiou des tubercules	élevée
Gale commune	faible
Gale poudreuse	moyenne
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	moyenne
Virus Y	très sensible
Sensibilité aux chocs	moyenne
Sensibilité à l'égermage	sensible

4. Besondere Hinweise

Etwas kurze Keimruhe.

4. Remarques particulières

La dormance est plutôt courte.

Celtiane ist eine gute Speisesorte mit festem und feinem Knollenfleisch. Die Sorte steht unter Vertragsproduktion und Vermarktungsschutz.


Celtiane est une excellente variété de consommation à chair fine et ferme. La production est faite sous contrat et une marque est déposée.

Pomme de terre
Variété de consommation

Charlotte

Kartoffeln
Speisesorte

Maturité	früh bis mittelfrüh <i>précoce à mi-précoce</i>	Reifegruppe
Obtenteur	Unicopa et Société L. Clause Coopérative de Lennon - Rte de Morlaix F - 29119 Châteauneuf du Faou	Züchter
Ascendance	Hansa x Danäe	Abstammung
Inscription sur la liste suisse	1984	Aufnahme in die Sortenliste
Représentant	Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband Ass. suisse des producteurs de semences CH - 1567 Delley	Vertreter



1.	Caractères morphologiques	1.	Morphologische Merkmale
Tubercule :	forme : long taille : moyenne à petite yeux : superficiels à mi-superficiels chair : jaune peau : jaune, lisse	Knolle :	Form : lang Grösse : mittel- bis kleinfallend Augen : flach bis mitteltief Fleischfarbe : gelb Schale : gelb, glatt
Tige :		Stengel :	
Feuille :	taille moyenne, port mi-étalé	Blatt :	mittelhoch
Fleur :	brillante, vert foncé rouge violacé à pointes blanches, floraison moyenne	Blüten :	glänzend, dunkelgrün rotviolett, mit weissen Flecken, mittelstark blühend

2.	Caractéristiques agronomiques et technologiques	2.	Werteigenschaften
Rendement : Calibre : Teneur en amidon : Rendement amidon : Type culinaire : Altération de la couleur - chair crue : - chair cuite : Sucres réducteurs (teneur): Utilisation technologique :	moyen faible faible à moyenne (11 - 14%) faible B-A moyenne faible faible frites	Ertrag : Kalibriererausbeute : Stärkegehalt : Stärkeertrag : Kochtyp : Verfärbung - roh : - gekocht : Reduzierende Zucker : Verarbeitungseignung :	mittel gering gering bis mittel (11 - 14%) niedrig B-A mittel gering gering Frites
3.	Sensibilités	3.	Anfälligkeiten
Galle verruqueuse : Nématodes : Mildiou des fanes : Mildiou des tubercules : Gale commune : Gale poudreuse : Taches de rouille : Sensibilité aux chocs : Virus de l'enroulement : Virus Y :	sensible sensible faible à moyenne faible à moyenne moyenne moyenne à faible moyenne à élevée faible à moyenne moyenne à élevée moyenne	Krebs : Nematoden : Krautfäule : Braunfäule : Flachschorf : Pulverschorf : Eisenfleckigkeit : Schlagempfindlichkeit : Blattroll : Virus Y :	anfällig anfällig gering bis mittel gering bis mittel mittel mittel bis gering mittel bis stark gering bis mittel mittel bis stark mittel
4.	Remarques particulières	4.	Besondere Hinweise
	Charlotte est résistante au champ au virus A.		Charlotte ist feldresistent gegen Virus A.
Charlotte est une excellente variété de consommation à chair ferme de type précoce.		Charlotte ist eine gute, frühreifende Speisesorte mit festem Knollenfleisch.	

Oeuvre commune des Stations fédérales de recherches agronomiques de Changins et de Reckenholz, de l'Association suisse des producteurs de semences à Delley et de swisspatat à Guin.

Gemeinsames Werk der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten Reckenholz und Changins, des Schweizerischen Saatgutproduzenten-Verbandes Delley und der swisspatat in Düringen.

Concordia

Kartoffeln		Pommes de terre
Speisesorte		Variété de consommation
Reifegruppe	früh bis mittelfrüh / précoce à mi-précoce	Maturité
Züchter	Europlant	Obtenteur
Abstammung	B 1019/2/95 x Jelly	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2017	Inscription dans la liste suisse
Vertreter	swisssem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/ Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form	kurzoval bis langoval
	Grösse	eher grossfallend
	Augen	flach
	Fleischfarbe	gelb
	Schale	gelb
Stängel	hoch, mittelaufrecht, ohne Pigmentierung	
Blatt	lanzettförmig, grün	
Blüten	weiss, selten	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme	oblongue courte à oblongue
	taille	plutôt grosse
	yeux	superficiels
	chair	jaune
	peau	jaune
Tige	de haute taille, mi-dressée, sans pigmentation	
Feuille	lancéolée, vert franc	
Fleur	blanche, rare	

Concordia

2. Werteigenschaften

Ertrag	hoch	
Kalibrierausbeute	hoch	
Stärkegehalt	mittel (13–15%)	
Stärkeertrag	mittel	
Kochtyp	B	
Verfärbungen	roh gekocht	gering gering
Reduzierende Zucker		
Verarbeitungseignung	Hausfrites	
Vorkeimdauer	5–7 Wochen	
Primeur	10–12 Wochen	

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement	élevé	
Calibre commercial	élevé	
Teneur en amidon	moyenne (13–15%)	
Rendement amidon	moyen	
Type culinaire	B	
Altération de la couleur	chair crue	faible
	chair cuite	faible
Sucres réducteurs		
Utilisation technologique	frites maison	
Prégermination	5–7 semaines	
Primeur	10–12 semaines	

3. Anfälligkeiten

Krebs	anfällig
Nematoden	nicht anfällig ($Ro_{1,4}$)
Krautfäule	stark
Knollenfäule	mittel
Flachschorf	mittel bis gering
Pulverschorf	mittel
Eisenfleckigkeit	gering
Blattrollvirus	gering
Virus Y	gering bis mittel
Schlagempfindlichkeit	gering bis mittel
Abkeimungsempfindlichkeit	mittel

3. Sensibilités

Galle verruqueuse	sensible
Nématodes	résistante ($Ro_{1,4}$)
Mildiou des fanes	élevée
Mildiou des tubercules	moyenne
Gale commune	moyenne à faible
Gale poudreuse	moyenne
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	faible
Virus Y	faible à moyenne
Sensibilité aux chocs	faible à moyenne
Sensibilité à l'égermage	moyenne

4. Besondere Hinweise

Die Knollen weisen eine mittlere bis lange Keimruhe auf.

4. Remarques particulières

Concordia a une dormance moyenne à prononcée.

Concordia ist eine mittelfrühe, eher grossfallende, gelbfleischige Speisesorte.

Concordia est une variété de consommation mi-précoce à chair jaune et aux tubercules plutôt gros.

Pomme de terre
Variété de consommation

Désirée

Kartoffeln
Speisesorte

Maturité	mittelfrüh mi-précoce	Reifegruppe
Obtenteur	de Z.P.C. Postbus 385 NL - 8901 BD Leeuwarden	Züchter
Ascendance	Urgenta x Depesche	Abstammung
Inscription sur la liste suisse	1961	Aufnahme in die Sortenliste
Représentant	Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband Ass. suisse des producteurs de semences CH - 1567 Delley	Vertreter



1.	Caractères morphologiques	1.	Morphologische Merkmale
Tubercule :	forme : oblong court à oblong long taille : grosse yeux : assez superficiels chair : jaune clair peau : rouge	Knolle :	Form : kurzoval bis langoval Grösse : grossfallend Augen : ziemlich flach Fleischfarbe : hellgelb Schale : rot
Tige :	assez nombreuses, hautes, port dressé	Stengel :	ziemlich zahlreich, hoch, aufrecht,
Feuille :	aisselles des feuilles violet brunâtre	Blatt :	Blattachseln bräunlich
Fleur :	vert foncé, grisâtre	Blüten :	graugrün
	rouge violacée, floraison abondante		rotviolett, starkblühend

2.	Caractéristiques agronomiques et technologiques	2.	Werteigenschaften
Rendement : Calibre : Teneur en amidon : Rendement amidon : Type culinaire : Altération de la couleur - chair crue : - chair cuite : Sucres réducteurs (teneur): Utilisation technologique :	élevé élevé moyenne à faible (13 - 15%) moyen B-C moyenne faible faible à moyenne rösti, frites	Ertrag : Kalibrierenausbeute : Stärkegehalt : Stärkeertrag : Kochtyp : Verfärbung - roh : - gekocht : Reduzierende Zucker : Verarbeitungseignung :	hoch hoch mittel bis niedrig (13 - 15%) mittel B-C mittel gering gering bis mittel Rösti, Frites
3.	Sensibilités	3.	Anfälligkeiten
Galle verruqueuse : Nématodes : Mildiou des fanes : Mildiou des tubercules : Gale commune : Gale poudreuse : Taches de rouille : Sensibilité aux chocs : Virus de l'enroulement : Virus Y :	pas sensible sensible faible faible élevée moyenne faible moyenne élevée faible	Krebs : Nematoden : Krautfäule : Braunfäule : Flachschorf : Pulverschorf : Eisenfleckigkeit : Schlagempfindlichkeit : Blattroll : Virus Y :	nicht anfällig anfällig gering gering stark mittel gering mittel stark gering
4.	Remarques particulières	4.	Besondere Hinweise
	La durée d'incubation est moyenne. Désirée est une variété robuste qui convient aux zones marginales de culture de la pomme de terre.		Die Inkubationsdauer ist mittel. Als robuste Sorte eignet sich Désirée für die Grenzlagen des Kartoffelbaus.

Désirée est une variété mi-précoce à peau rouge; elle se consomme à l'état frais et se prête à la transformation par l'industrie alimentaire.

Désirée ist eine mittelfrühe, rotschalige Speisesorte für den Frischkonsum und die technische Verarbeitung.

Oeuvre commune des Stations fédérales de recherches agronomiques de Changins et de Reckenholz, de l'Association suisse des producteurs de semences à Delley et de swisspatat à Guin.

Gemeinsames Werk der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten Reckenholz und Changins, des Schweizerischen Saatgutproduzenten-Verbandes Delley und der swisspatat in Düringen.

Pomme de terre
Variété de consommation

Ditta

Kartoffeln
Speisesorte

Maturité	mittelfrüh <i>mi-précoce</i>	Reifegruppe
Obtenteur	Niederösterreichische Saatbaugenossenschaft GmbH Meires, Windigsteig, Österreich	Züchter
Ascendance	Bintje x Quarta	Abstammung
Inscription sur la liste suisse	1998	Aufnahme in die Sortenliste
Représentant	Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband Ass. suisse des producteurs de semences CH - 1567 Delley	Vertreter



1.	Caractères morphologiques	1.	Morphologische Merkmale
Tubercule :	forme : oblongue à longue taille : moyenne yeux : superficiels à mi-superficiels chair : jaune foncé à jaune peau : jaune	Knolle :	Form : langoval bis lang Grösse : mittelgrossfallend Augen : flach bis mittelflach Fleischfarbe : tiefgelb bis gelb Schale : gelb
Tige :	taille moyenne, port mi-dressé avec forte pigmentation à la base des tiges	Stengel :	mittelhoch, mittelaufrecht, stark pigmentierte Stengelbasis
Feuille :		Blatt :	mittelgrün, helle Adern, zusammengewachsene Endblätter
Fleur :	vert tendre, nervures claires, foliole terminale soudée crème, floraison moyennement abondante	Blüten :	crème, mittelstark blühend

2.	Caractéristiques agronomiques et technologiques	2.	Werteigenschaften
Rendement : Calibre : Teneur en amidon : Rendement amidon : Type culinaire : Altération de la couleur - chair crue : - chair cuite : Sucres réducteurs (teneur): Utilisation technologique :	élevé moyen moyenne (12 - 14,5%) moyen B-A faible moyenne moyenne aucune	Ertrag : Kalibrierbeute : Stärkegehalt : Stärkeertrag : Kochtyp : Verfärbung - roh : - gekocht : Reduzierende Zucker : Verarbeitungseignung :	hoch mittel mittel (12 - 14,5%) mittel B-A niedrig mittel mittel keine
3.	Sensibilités	3.	Anfälligkeiten
Galle verruqueuse : Nématodes : Mildiou des fanes : Mildiou des tubercules : Gale commune : Gale poudreuse : Taches de rouille : Virus de l'enroulement : Virus Y : Sensibilité aux chocs : Sensibilité à l'égermage :	résistante résistante au pathotype R ₁ moyenne moyenne faible faible faible moyenne moyenne faible très élevée	Krebs : Nematoden : Krautfäule : Braunfäule : Flachschorf : Pulverschorf : Eisenfleckigkeit : Blattroll : Virus Y : Schlagempfindlichkeit : Abkeimungsempfindlichkeit :	nicht anfällig nicht anfällig Pathotyp Ro ₁ mittel mittel gering gering gering mittel mittel gering sehr hoch
4.	Remarques particulières	4.	Besondere Hinweise
	La dormance est assez longue. Bonne conservation.		Die Keimruhe ist ziemlich lang. Eignet sich gut für die Lagerung
Ditta est une excellente variété de consommation à chair ferme.		Ditta ist eine gute Speisesorte mit festem Knollenfleisch.	

Oeuvre commune des Stations fédérales de recherches agronomiques de Changins et de Reckenholz, de l'Association suisse des producteurs de semences à Delley et de swisspatat à Guin.

Gemeinsames Werk der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten Reckenholz und Changins, des Schweizerischen Saatgutproduzenten-Verbandes Delley und der swisspatat in Düringen.

Emanuelle


Autoren: Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche und Patrice de Werra
Gemeinsames Werk von Agroscope, swisssem in Delley und der swisspatat in Bern

November 2023

Auteurs: Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche et Patrice de Werra
Œuvre commune d'Agroscope, de swisssem à Delley et de swisspatat à Berne

Novembre 2023

Kartoffeln		Pommes de terre
Speisesorte		Variété de consommation
Reifegruppe	mittelfrüh / mi-précoce	Maturité
Züchter	HZPC (NL)	Obtenteur
Abstammung	Allians × Cezanne	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2024	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	swisssem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband / Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	oval bis langoval
	Grösse:	mittel
	Augen:	flach
	Fleischfarbe:	gelb
	Schale:	gelb
Stängel	fein, mitteldeckend, ohne Pigmentation	
Blatt	hellgrün, lanzettenförmig	
Blüten	weiss, schwachblühend	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme:	oblongue à longue
	taille:	moyenne
	yeux:	superficiels
	chair:	jaune
	peau:	jaune
Tige	petite taille, étalée sans pigmentation	
Feuille	vert franc, lencéolé	
Fleur	blanche, rare	

Emanuelle

2. Werteigenschaften

Ertrag	hoch
Kalibrierausbeute	hoch
Stärkegehalt	mittel (10–15 %)
Stärkeertrag	mittel
Kochtyp	B–A
Verfärbungen	roh: mittel gekocht: mittel
Reduzierende Zucker	
Verarbeitungseignung	keine

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement	élevé
Calibre commercial	élevé
Teneur en amidon	moyenne (10–15 %)
Rendement amidon	moyen
Type culinaire	B–A
Altération de la couleur	chair crue: moyenne chair cuite: moyenne
Sucres réducteurs	
Utilisation technologique	néant

3. Anfälligkeiten

Krebs	resistent
Nematoden	resistent (Ro ₁ , Ro ₄)
Krautfäule	wenig
Knollenfäule	wenig
Flachschorf	wenig
Pulverschorf	wenig
Eisenfleckigkeit	gering
Blattroll	gering
Virus Y	hoch, Y ^{NTN} hoch
Schlagempfindlichkeit	gering

3. Sensibilités

Galle verruqueuse	résistante
Nématodes	résistante (Ro ₁ , Ro ₄)
Mildiou des fanes	faible
Mildiou des tubercules	moyenne à faible
Gale commune	faible
Gale poudreuse	faible
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	faible
Virus Y	élevée, Y ^{NTN} élevée
Sensibilité aux chocs	faible

4. Besondere Hinweise

Die Knollen haben eine mittlere Keimruhe.
Sie ergrünen am Licht rasch.

4. Remarques particulières

Les tubercules ont une dormance moyenne.
Ils sont sensibles au verdissement.

Emanuelle ist eine mittelfrühe,
ziemlich festkochende Sorte.
Sie hat eine gute Krautfäuleresistenz.

Emanuelle est une variété mi-précoce,
plutôt ferme et très peu sensible au mildiou.


Impressum

Herausgeber
Auskünfte
Redaktion
Gestaltung
Fotos
Copyright

Agroscope, www.agroscope.ch
Ruedi Schwärzel, Agroscope,
ruedi.schwaerzel@agroscope.admin.ch
Andrea Leuenberger, Agroscope
Christoph Meichtry, Valmedia AG, Visp
Carole Parodi, Agroscope
© Agroscope 2023

Erika

Kartoffeln		Pommes de terre
Speisesorte		Variété de consommation
Reifegruppe	früh / précoce	Maturité
Züchter	Niederösterreichische (AU)	Obtenteur
Abstammung	Marabel X AR88-156	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2014	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	swissem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/ Association suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	langoval bis lang
	Grösse:	mittel bis klein
	Augen:	flach
	Fleischfarbe:	gelb bis hellgelb
	Schale:	gelb
Stängel	mittelhoch, mittelaufrecht, leichte Pigmentierung	
Blatt	hellgrün	
Blüten	ohne	

1. Caractères morphologiques	
Tubercule	forme: oblongue à longue taille: moyenne à petite yeux: superficiels chair: jaune à jaune clair peau: jaune
Tige	taille moyenne, port mi-dressé, légère pigmentation
Feuille	vert clair
Fleur	sans

Erika

2. Werteigenschaften

Ertrag	mittel
Kalibrierungsbeute	mittel
Stärkegehalt	mittel (11 – 13 %)
Stärkeertrag	mittel
Kochtyp	A – B
Verfärbungen	roh: gering gekocht: gering
Reduzierende Zucker	mittel bis mittel hoch (1,38% TS)
Verarbeitungseignung	keine
Vorkeimdauer	4 – 5 Wochen; Primeur: 10 – 12 Wochen

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement	moyen
Calibre commercial	moyen
Teneur en amidon	moyenne (11 – 13%)
Rendement amidon	moyen
Type culinaire	A – B
Altération de la couleur	chair crue: faible chair cuite: faible
Sucres réducteurs	moyenne à assez élevée (1,38% MS)
Utilisation technologique	néant
Prégermination	4 – 5 semaines; primeur: 10 – 12 semaines

3. Anfälligkeiten

Krebs	anfällig
Nematoden	nicht anfällig (Ro _{1,4})
Krautfäule	hoch
Braunfäule	mittel
Flachschorf	gering
Pulverschorf	mittel
Eisenfleckigkeit	gering bis mittel
Blattroll	gering
Virus Y	gering, etwas NTN
Schlagempfindlichkeit	gering
Abkeimungsempfindlichkeit	mittel bis gering

3. Sensibilités

Galle verruqueuse	sensible
Nématodes	résistante (Ro _{1,4})
Mildiou des fanes	élevée
Mildiou des tubercules	moyenne
Gale commune	faible
Gale poudreuse	moyenne
Taches de rouille	faible à moyenne
Virus de l'enroulement	faible
Virus Y	faible, un peu NTN
Sensibilité aux chocs	faible
Sensibilité à l'égermage	moyenne à faible

4. Besondere Hinweise

Keimruhe ist ausgeprägt.

4. Remarques particulières

Erika a une bonne dormance.

Erika eignet sich besonders für Salzkartoffeln oder Kartoffelsalat.

Erika est particulièrement appréciée en pommes de terre nature et en salade.

Favola

Autorinnen und Autoren

Mout De Vrieze, Benjamin Hauser, Leonardo Piva,
Christian Vetterli, Patrice de Werra

Gemeinsames Werk von Agroscope,
swissem in Delley und der swisspatat in Bern

Dezember 2025

Autrices et auteurs

Mout De Vrieze, Benjamin Hauser, Leonardo Piva,
Christian Vetterli, Patrice de Werra

Œuvre commune d'Agroscope,
swissem à Delley et de swisspatat à Bern

Décembre 2025

Kartoffeln		Pommes de terre
Verarbeitungssorte		Variété pour l'industrie alimentaire
Reifegruppe	mittelfrüh bis mittelspät/ mi-précocde à mi-tardive	Maturité
Züchter	Europlant (DE)	Obtenteur
Abstammung	unbekannt/inconnu	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2026	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	swissem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/ Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	rund
	Grösse:	gross
	Augen:	flach
	Fleischfarbe:	hellgelb
	Schale:	gelb
Stängel	hoch, aufrecht, nicht pigmentiert	
Blatt	mittelgrün	
Blüten	weiss	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme:	ronde
	taille:	grande
	yeux:	superficiels
	chair:	jaune clair
	peau:	jaune
Tige	taille haute, dressée, sans pigmentation	
Feuille	vert franc	
Fleur	blanche	

Favola

2. Werteigenschaften	
Ertrag	hoch bis sehr hoch
Kalibrierbeute	hoch
Stärkegehalt	mittel (15–18 %)
Stärkeertrag	mittel
Kochtyp	C–B
Verfärbungen	roh: mittel bis gering gekocht: gering
Reduzierende Zucker	gering
Verarbeitungseignung	Chips

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques	
Rendement	moyen à élevé
Calibre commercial	élevé
Teneur en amidon	moyenne (15–18 %)
Rendement amidon	moyen
Type culinaire	C–B
Altération de la couleur	chair crue: moyenne à faible chair cuite: faible
Sucres réducteurs	faible
Utilisation technologique	Chips

3. Anfälligkeiten	
Krebs	keine Information vorhanden
Nematoden	Resistent (Ro _i)
Krautfäule	hoch
Knollenfäule	mittel
Flachschorf	gering bis mittel
Pulverschorf	gering bis mittel
Eisenfleckigkeit	gering
Blattroll	gering
Virus Y	mittel bis hoch, Y ^{NTN} mittel
Schlagempfindlichkeit	gering bis mittel

3. Sensibilités	
Galle verruqueuse	pas d'information disponible
Nématodes	résistante (Ro _i)
Mildiou des fanes	élevée
Mildiou des tubercules	moyenne
Gale commune	faible à moyenne
Gale poudreuse	faible à moyenne
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	faible
Virus Y	moyenne à élevée, Y ^{NTN} moyenne
Sensibilité aux chocs	faible à moyenne

4. Besondere Hinweise

4. Remarques particulières

Favola

Favola

Impressum

Herausgeber Agroscope, www.agroscope.ch
 Auskünfte Mout De Vrieze, Agroscope
mout.devrieze@agroscope.admin.ch
 Redaktion Andrea Leuenberger, Agroscope
 Gestaltung Christoph Meichtry, Valmedia AG, Visp
 Fotos Carole Parodi, Mout De Vrieze, Agroscope
 Copyright © Agroscope 2025

Kartoffeln

Verarbeitungssorte

Reifegruppe

Züchter

Abstammung

Aufnahme
in die Sortenliste

Vertreter

Fontane

mittelspät bis mittelfrüh/
mi-tardive à mi-précoce

Svalöf Weibull/Agrico,
NL-8300 AB Emmeloord

Agria x AR76-34-3
2001

Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/
*Association suisse des producteurs
de semences*
CH-1567 Delley

Pommes de terre

*Variété pour l'industrie
alimentaire*

Maturité

Obtenteur

Ascendance

*Inscription
sur la liste suisse*

Représentant



1. Morphologische Merkmale

Knolle	Form:	kurzoval bis langoval
	Grösse:	mittelgrossfallend
	Augen:	mittelflach
	Fleischfarbe:	gelb
	Schale:	gelb
Stängel:	mittelhoch, aufrecht, stark pigmentiert	
Blatt:	graugrünlich, klein bis mittelgross	
Blüten:	creme, selten blühend	

1. Caractères morphologiques

Tubercule	forme:	oblongue courte à oblongue
	taille:	moyenne
	yeux:	mi-superficiels
	chair:	jaune
	peau:	jaune
Tige:	de taille moyenne, port dressé, avec forte pigmentation	
Feuille:	vert grisâtre, moyenne à petites folioles	
Fleur:	crème, floraison peu abondante	

2. Werteigenschaften

Ertrag:	hoch
Kalibrierbeute:	mittel
Stärkegehalt:	ziemlich hoch (15-18%)
Stärkeertrag:	ziemlich hoch
Kochtyp:	C - D
Verfärbung	
roh:	gering
gekocht:	gering
Verarbeitungseignung:	Pommes Frites, Chips

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement:	élevé
Calibre commercial:	moyen
Teneur en amidon:	assez élevée (15-18%)
Rendement amidon:	assez élevé
Type culinaire:	C - D
Altération de la couleur	
chair crue:	faible
chair cuite:	faible
Utilisation technologique:	frites, chips

3. Anfälligkeiten

Krebs:	nicht anfällig
Nematoden:	nicht anfällig (Pathotyp Ro ₁ + Ro ₄)
Krautfäule:	mittel bis ziemlich hoch
Braunfäule:	mittel
Flachschorf:	gering
Pulverschorf:	mittel
Eisenfleckigkeit:	gering
Blattroll:	mittel
Virus Y:	mittel
Schlagempfindlichkeit:	mittel
Abkeimungs-empfindlichkeit:	gering

3. Sensibilités

Galle verruqueuse:	résistante
Nématodes:	résistante aux pathotypes Ro ₁ + Ro ₄
Mildiou des fanes:	moyenne à assez élevée
Mildiou des tubercules:	moyenne
Gale commune:	faible
Gale poudreuse:	moyenne
Taches de rouille:	faible
Virus de l'enroulement:	moyenne
Virus Y:	moyenne
Sensibilité aux chocs:	moyenne
Sensibilité à l'égermage:	faible

4. Besondere Hinweise

Die Knollen zeigen eine ausgeprägte Keimruhe und lagern sich sehr gut.

4. Remarques particulières

Les tubercules ont une dormance prononcée et se conservent bien.

Fontane ist eine mittelspäte bis mittelfrühe Verarbeitungssorte mit ausgezeichneter Qualität für verschiedene Produkte und guter Lagereignung.

Fontane est une variété mi-tardive à mi-précoce qui convient particulièrement bien à la fabrication de frites, mais aussi de chips, röstis et croquettes.

Francis

Autorinnen und Autoren

Mout De Vrieze, Benjamin Hauser, Leonardo Piva,
Christian Vetterli, Patrice de Werra

Gemeinsames Werk von Agroscope,
swissem in Delley und der swisspatat in Bern

Dezember 2025

Autrices et auteurs

Mout De Vrieze, Benjamin Hauser, Leonardo Piva,
Christian Vetterli, Patrice de Werra

Œuvre commune d'Agroscope,
swissem à Delley et de swisspatat à Bern

Décembre 2025

Kartoffeln		Pommes de terre
Verarbeitungssorte		Variété pour l'industrie alimentaire
Reifegruppe	früh bis mittelfrüh / précoce à mi-précoce	Maturité
Züchter	Interseed (DE)	Obtenteur
Abstammung	Action × ISP 14-15-03	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2026	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	swissem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband / Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	oval bis langoval
	Grösse:	gross
	Augen:	flach
	Fleischfarbe:	hellgelb
	Schale:	gelb
Stängel	hoch, mittelaufrecht, nicht pigmentiert	
Blatt	mittelgrün	
Blüten	weiss	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme:	oblongue à longue
	taille:	grande
	yeux:	superficiels
	chair:	jaune clair
	peau:	jaune
Tige	taille haute, mi-dressée, sans pigmentation	
Feuille	vert franc	
Fleur	blanche	

Francis

2. Werteigenschaften	
Ertrag	hoch bis sehr hoch
Kalibrierbeute	hoch
Stärkegehalt	mittel (13–16 %)
Stärkeertrag	mittel
Kochtyp	C–B
Verfärbungen	roh: mittel gekocht: wenig
Reduzierende Zucker	keine Information vorhanden
Verarbeitungseignung	Frites

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques	
Rendement	élevé à très élevé
Calibre commercial	élevé
Teneur en amidon	moyenne (13–16 %)
Rendement amidon	moyen
Type culinaire	C–B
Altération de la couleur	chair crue: moyenne chair cuite: faible
Sucres réducteurs	pas d'information disponible
Utilisation technologique	Frites

3. Anfälligkeiten	
Krebs	keine Information vorhanden
Nematoden	resistent (Ro ₁ , Ro ₄)
Krautfäule	mittel
Knollenfäule	gering
Flachschorf	gering
Pulverschorf	gering
Eisenfleckigkeit	gering
Blattroll	hoch
Virus Y	mittel, Y ^{NTN} mittel
Schlagempfindlichkeit	gering

3. Sensibilités	
Galle verruqueuse	pas d'information disponible
Nématodes	résistante (Ro ₁ , Ro ₄)
Mildiou des fanes	moyenne
Mildiou des tubercules	faible
Gale commune	faible
Gale poudreuse	faible
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	élevée
Virus Y	moyenne, Y ^{NTN} moyenne
Sensibilité aux chocs	faible

4. Besondere Hinweise
Für die Verarbeitung direkt nach der Ernte geeignet.

4. Remarques particulières
Adaptée pour la transformation en sortie de champ.

Francis

Francis

Impressum

Herausgeber Agroscope, www.agroscope.ch
 Auskünfte Mout De Vrieze, Agroscope
 mout.devrieze@agroscope.admin.ch
 Redaktion Andrea Leuenberger, Agroscope
 Gestaltung Christoph Meichtry, Valmedia AG, Visp
 Fotos Carole Parodi, Mout De Vrieze, Agroscope
 Copyright © Agroscope 2025

Gwenne

Kartoffeln		Pommes de terre
Speisesorte		Variété de consommation
Reifegruppe	mittelfrüh / mi-précoce	Maturité
Züchter	Germicopa SAS (F)	Obtenteur
Abstammung	INRA 94T97.43 X G93TT296006	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2014	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	APPNAL Association suisse des producteurs de pommes de terre nouvelles de l'Arc lémanique CH-1260 Nyon	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	langoval bis lang
	Grösse:	mittel bis klein
	Augen:	flach
	Fleischfarbe:	hellgelb
	Schale:	gelb
Stängel	hoch, mittelaufrecht, ohne Pigmentierung	
Blatt	tiefgrün bis grün	
Blüten	weiss, mittel bis selten	

1. Caractères morphologiques			
Tubercule	forme:	oblongue à longue	
	taille:	moyenne à petite	
	yeux:	superficiels	
	chair:	jaune clair	
	peau:	jaune	
Tige	de grande taille port mi-dressé, sans pigmentation		
Feuille	vert foncé à vert		
Fleur	blanche, floraison moyenne à rare		

Gwenne

2. Werteigenschaften

Ertrag	hoch
Kalibrierungsbeute	hoch
Stärkegehalt	mittel (11 – 14 %)
Stärkeertrag	mittel
Kochtyp	B – A
Verfärbungen	roh: gering gekocht: gering
Reduzierende Zucker	mittel (0,9% TS)
Verarbeitungseignung	keine
Vorkeimdauer	4 – 5 Wochen; Primeur: 10 – 12 Wochen

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement	élevé
Calibre commercial	élevé
Teneur en amidon	moyenne (11 – 14%)
Rendement amidon	moyen
Type culinaire	B – A
Altération de la couleur	chair crue: faible chair cuite: faible
Sucres réducteurs	moyenne (0,9% MS)
Utilisation technologique	néant
Prégermination	4 – 5 semaines; primeur: 10 – 12 semaines

3. Anfälligkeiten

Krebs	anfällig
Nematoden	nicht anfällig (Ro ₁₋₄)
Krautfäule	hoch
Knollenfäule	hoch
Flachschorf	mittel bis gering
Pulverschorf	mittel
Eisenfleckigkeit	gering
Blattroll	gering
Virus Y	anfällig, etwas Virus Y ^{NTN}
Schlagempfindlichkeit	gering
Abkeimungsempfindlichkeit	mittel

3. Sensibilités

Galle verruqueuse	sensible
Nématodes	résistante (Ro ₁₋₄)
Mildiou des fanes	élevée
Mildiou des tubercules	élevée
Gale commune	moyenne à faible
Gale poudreuse	moyenne
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	faible
Virus Y	faible, un peu de virus Y ^{NTN}
Sensibilité aux chocs	faible
Sensibilité à l'égermage	moyenne

4. Besondere Hinweise

Die Keimruhe ist eher kurz.

4. Remarques particulières

Gwenne a une dormance plutôt courte.

Gwenne eignet sich besonders für Salzkartoffeln, Kartoffelstock oder Kartoffelsalat. Die Sorte steht unter Vertragsproduktion und Vermarktungsschutz.

Gwenne est particulièrement appréciée en pommes de terre nature, purée et en salade. La production est faite sous contrat et une marque est déposée.

Kartoffeln

Speisesorte

Reifegruppe

Züchter

Abstammung

Aufnahme in die
Sortenliste

Vertreter

Innovator

mittelfrüh/mi-précoce

HZPC Holland BV
NL-8300 BD Leuwarden

Shepody × RZ 84-2580

2002

Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/
Association suisse des producteurs
de semences
CH-1567 Delley

Pommes de terre

Variété de consommation


Maturité

Obtenteur

Ascendance

Inscription
sur la liste suisse

Représentant



1. Morphologische Merkmale

Knolle	Form:	langoval
	Grösse:	gross- bis sehr grossfallend
	Augen:	flach
	Fleischfarbe:	hellgelb
	Schale:	gräulich, genetzt
Stängel	hoch, mittelaufrecht, ohne Pigmentierung	
Blatt	ziemlich hellgrün, mittelaufrecht	
Blüten	weiss, mittelstark bis stark blühend	

1. Caractères morphologiques

Tubercule	forme:	oblongue
	taille:	grosse à très grosse
	yeux:	superficiels
	chair:	jaune clair
	peau:	ocre, réticulée
Tige	de taille haute, port mi-dressé, sans pigmentation	
Feuille	vert assez clair, moyenne dressée	
Fleur	blanche, floraison moyenne à abondante	

2. Werteigenschaften

Ertrag:	hoch
Kalibrierbeute:	hoch
Stärkegehalt:	mittel (13-16%)
Stärkeertrag:	mittel bis hoch
Kochtyp:	C
Verfärbung	
roh:	gering
gekocht:	mittel bis gering
Reduzierende Zucker:	mittel (0,62 bis 1%, TS)
Verarbeitungseignung:	Frites
Vorkeimdauer:	6 Wochen

3. Anfälligkeiten

Krebs:	nicht anfällig
Nematoden:	nicht anfällig (Pathotyp Pa _{1, 2, 3})
Krautfäule:	sehr gering
Braunfäule:	gering
Flachschorf:	mittel bis gering
Pulverschorf:	gering
Eisenfleckigkeit:	gering bis mittel
Blattroll:	mittel
Virus Y:	stark
Schlagempfindlichkeit:	mittel
Abkeimungs- empfindlichkeit:	gering

4. Besondere Hinweise

Knollen sind eher rauschalig und genetzt, gleichwohl recht feinschalig. Die Knollen lagern sich sehr gut. Sie ist aber empfindlich gegenüber Metribuzin.

Innovator ist eine mittelfrühe, grossfallende Verarbeitungssorte für Frites und Speiseflocken. Sie eignet sich gut für die ökologische Produktion.

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement:	élevé
Calibre commercial:	élevé
Teneur en amidon:	moyenne (13-16%)
Rendement amidon:	moyen à élevé
Type culinaire:	C
Altération de la couleur	
chair crue:	faible
chair cuite:	moyenne à faible
Sucres réducteurs (teneur):	moyenne (0,62 à 1%, MS)
Utilisation technologique:	frites
Prégermination:	6 semaines

3. Sensibilités

Galle verruqueuse:	résistante
Nématodes:	résistante aux pathotypes Pa _{1, 2, 3}
Mildiou des fanes:	très faible
Mildiou des tubercules:	faible
Gale commune:	moyenne à faible
Gale poudreuse:	faible
Taches de rouille:	faible à moyenne
Virus de l'enroulement:	moyenne
Virus Y:	élevée
Sensibilité aux chocs:	moyenne
Sensibilité à l'égermage:	faible

4. Remarques particulières

Innovator a une peau rugueuse et réticulée, mais plutôt fine. Sa dormance est bonne, elle se conserve bien. Elle est sensible à la métribuzine.

Innovator est une variété mi-précoce qui produit de gros tubercules. Elle est destinée à la transformation en frites et en purée par l'industrie alimentaire. Elle convient bien à une production écologique.

Ivory Russet

Kartoffeln		Pommes de terre
Verarbeitungssorte		Variété pour l'industrie alimentaire
Reifegruppe	mittelfrüh / mi-précoce	Maturité
Züchter	HZPC (NL)	Obtenteur
Abstammung	RZ-93-7105 X Innovator	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2018	Inscription dans la liste suisse
Vertreter	swisssem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/ Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form	langoval, regelmässig
	Grösse	mittel
	Augen	flach
	Fleischfarbe	weiss
	Schale	ocker
Stängel	mittelhoch, mittelaufrecht, leicht pigmentiert	
Blatt	mittel lanzettförmig, grün	
Blüten	lila, schwach bis mittelblühend	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme	oblongue, régulière
	taille	moyenne
	yeux	superficiels
	chair	blanche
	peau	ocre
Tige	de taille moyenne, mi-dressée, avec légère pigmentation	
Feuille	moyenne lancéolée, vert franc	
Fleur	mauve, rare à moyenne	

Ivory Russet

2. Werteigenschaften

Ertrag	mittel bis hoch
Kalibrierungsbeute	hoch
Stärkegehalt	hoch (15–17%)
Stärkeertrag	hoch
Kochtyp	C–B
Reduzierende Zucker	mittel (0,51% TS)
Verarbeitungseignung	Frites
Vorkeimdauer	5–6 Wochen

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement	moyen à élevé
Calibre commercial	élevé
Teneur en amidon	élevée (15–17%)
Rendement amidon	élevé
Type culinaire	C–B
Sucres réducteurs	moyens (0,51% MS)
Utilisation technologique	frites
Prégermination	5–6 semaines

3. Anfälligkeiten

Krebs	anfällig
Nematoden	anfällig
Krautfäule	gering bis mittel
Knollenfäule	gering bis mittel
Flachschorf	gering
Pulverschorf	gering
Eisenfleckigkeit	gering
Blattrollvirus	gering
Virus Y	hoch
Schlagempfindlichkeit	gering

3. Sensibilités

Galle verruqueuse	sensible
Nématodes	sensible
Mildiou des fanes	faible à moyenne
Mildiou des tubercules	faible à moyenne
Gale commune	faible
Gale poudreuse	faible
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	faible
Virus Y	élevée
Sensibilité aux chocs	faible

4. Besondere Hinweise

Die Knollen haben eine ziemlich gute Keimruhe.

4. Remarques particulières

Les tubercules ont une assez bonne dormance.

Ivory Russet ist eine mittelfrühreife Fritessorte mit einer guten Backqualität.

Ivory Russet est une variété mi-précoce avec une bonne aptitude à la transformation en frites.

Kartoffeln

Speisesorte

Reifegruppe

Züchter

Abstammung

Aufnahme in die Sortenliste

Vertreter

Jelly

mittelspät/mi-tardive

Europlant,
D-21337 Lüneburg

Marabel × Stamm

2007

swissem
Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/
*Association suisse des producteurs
de semences*
1567 Delley

Pommes de terre

Variété de consommation

Maturité

Obtenteur

Ascendance

*Inscription
sur la liste suisse*

Représentant



1. Morphologische Merkmale

Knolle	Form:	kurzoval
	Grösse:	mittelgrossfallend und ziemlich regelmässig
	Augen:	flach bis mittelflach
	Fleischfarbe:	gelb
	Schale:	gelb
Stängel	hoch, mittelaufrecht, leicht pigmentiert	
Blatt	grün, glänzend	
Blüten	weiss, selten	

1. Caractères morphologiques

Tubercule	forme:	oblongue courte
	taille:	plutôt grosse et assez régulière
	yeux:	superficiels à mi-superficiels
	chair:	jaune
	peau:	jaune
Tige	de taille haute, port mi-dressé, avec légère pigmentation	
Feuille	verte, brillante	
Fleur	blanche, floraison rare	

2. Werteigenschaften

Ertrag:	hoch
Kalibrierbeute:	hoch
Stärkegehalt:	mittel (13-16%)
Stärkeertrag:	mittel
Kochtyp:	B
Verfärbung	
roh:	mittel
gekocht:	gering
Reduzierende Zucker:	gering (0,57% TS)
Verarbeitungseignung:	Frites
Vorkeimdauer:	7 Wochen

3. Anfälligkeiten

Krebs:	nicht anfällig
Nematoden:	nicht anfällig (Pathotyp Ro ₁ , Ro ₃₋₅)
Krautfäule:	mittel bis ziemlich gering
Braunfäule:	ziemlich gering bis mittel
Flachschorf:	gering
Pulverschorf:	mittel bis hoch
Eisenfleckigkeit:	gering
Blattroll:	mittel
Virus Y:	gering
Schlagempfindlichkeit:	gering
Abkeimungs- empfindlichkeit:	gering

4. Besondere Hinweise

Jelly ist tolerant gegenüber Hitze- und Trockenstress. Vorkeimung ist empfohlen, um die Abreife zu fördern.

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement:	élevé
Calibre commercial:	élevé
Teneur en amidon:	moyenne (13-16%)
Rendement amidon:	moyen
Type culinaire:	B
Altération de la couleur	
chair crue:	moyenne
chair cuite:	faible
Sucres réducteurs (teneur):	faible (0,57% MS)
Utilisation technologique:	frites
Prégermination:	7 semaines

3. Sensibilités

Galle verruqueuse:	résistante
Nématodes:	résistante aux pathotypes Ro ₁ et Ro ₃₋₅
Mildiou des fanes:	moyenne à assez faible
Mildiou des tubercules:	assez faible à moyenne
Gale commune:	faible
Gale poudreuse:	moyenne à élevée
Taches de rouille:	faible
Virus de l'enroulement:	moyenne
Virus Y:	faible
Sensibilité aux chocs:	faible
Sensibilité à l'égermage:	faible

4. Remarques particulières

Jelly tolère les stress de croissance tels que chaleur et sécheresse. La prégermination est recommandée afin d'avancer la maturité.

Jelly ist eine mittelspäte Speisekartoffelsorte. Die Knollen lagern sich gut und eignen sich zur Herstellung von Kartoffelsalat, Kartoffelstock, Rösti und Pommes frites.

Jelly est une variété mi-tardive de consommation. Elle se conserve bien et se prête à la fabrication de salade, purée, rösti et frites.

Kartoffeln

Speisesorte

Reifegruppe

Züchter

Abstammung

Aufnahme in die
Sortenliste

Vertreter

Lady Christl

sehr früh/*très précoce*

Meijer BV

NL-4416 ZG Kruiningen

WS 73-3-391 × Mansour

2002

Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/
*Association suisse des producteurs
de semences*
CH-1567 Delley

Pommes de terre

Variété de consommation

Maturité

Obtenteur

Ascendance

*Inscription
sur la liste suisse*

Représentant



1. Morphologische Merkmale

Knolle	Form:	lang- bis kurzoval
	Grösse:	mittelgrossfallend
	Augen:	flach
	Fleischfarbe:	gelb
	Schale:	gelb bis hellgelb
Stängel	mittelhoch, liegend mittelstark pigmentiert	
Blatt	grauhellgrün, etwas platt	
Blüten	rotviolett, schwachblühend	

1. Caractères morphologiques

Tubercule	forme:	oblongue à oblongue courte
	taille:	moyenne
	yeux:	superficiels
	chair:	jaune
	peau:	jaune à jaune clair
Tige	de taille moyenne, port étalé, avec pigmentation moyenne	
Feuille	vert grisâtre clair, plane	
Fleur	rouge violacée, floraison très rare	

2. Werteigenschaften

Ertrag:	mittel bis hoch
Kalibrierbeute:	mittel
Stärkegehalt:	niedrig (11-13%)
Stärkeertrag:	niedrig
Kochtyp:	A - B
Verfärbung	
roh:	gering
gekocht:	gering
Reduzierende Zucker:	hoch
Verarbeitungseignung:	keine
Vorkeimdauer:	4-5 Wochen
Primeur:	8-9 Wochen

3. Anfälligkeiten

Krebs:	nicht anfällig
Nematoden:	nicht anfällig (Pathotyp Ro ₁)
Krautfäule:	stark
Braunfäule:	mittel
Flachschorf:	gering
Pulverschorf:	stark
Eisenfleckigkeit:	stark
Blattroll:	mittel
Virus Y:	gering
Schlagempfindlichkeit:	mittel
Abkeimungs- empfindlichkeit:	mittel

4. Besondere Hinweise

Lady Christl ist anfällig für Eisenfleckigkeit und Pulverschorf. Sie ist Metribuzin empfindlich und zeigt Magnesium-Unterversorgung recht gut.

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement:	moyen à élevé
Calibre commercial:	moyen
Teneur en amidon:	faible (11-13%)
Rendement amidon:	faible
Type culinaire:	A - B
Altération de la couleur	
chair crue:	faible
chair cuite:	faible
Sucres réducteurs (teneur):	élevée
Utilisation technologique:	inapte
Prégermination:	4-5 semaines
Primeur:	8-9 semaines

3. Sensibilités

Galle verruqueuse:	résistante
Nématodes:	résistante au pathotype Ro ₁
Mildiou des fanes:	élevée
Mildiou des tubercules:	moyenne
Gale commune:	faible
Gale poudreuse:	élevée
Taches de rouille:	élevée
Virus de l'enroulement:	moyenne
Virus Y:	faible
Sensibilité aux chocs:	moyenne
Sensibilité à l'égermage:	moyenne

4. Remarques particulières

Lady Christl est une variété sensible aux taches de rouille et à la gale poudreuse. Elle est sensible à la métribuzine et exige un sol suffisamment pourvu de magnésium.

Lady Christl ist eine Frühsorte für den Frischkonsum mit einer sehr guten Speisequalität.

Lady Christl est une variété très précoce destinée à la culture de primeur. Sa chair est humide et assez ferme.

Kartoffeln

Speisesorte

Reifegruppe

Züchter

Abstammung

Aufnahme in die
Sortenliste

Vertreter

Lady Claire

früh bis mittelfrüh/*précoce à mi-précoce*

Meijer BV
NL-4416 ZG Kruiningen

Agria × KW 78-34-470

2002

Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/
*Association suisse des producteurs
de semences*
CH-1567 Delley

Pommes de terre

Variété de consommation

Maturité

Obtenteur

Ascendance

*Inscription
sur la liste suisse*

Représentant



1. Morphologische Merkmale

Knolle	Form:	kurzoval bis rund
	Grösse:	mittelgrossfallend
	Augen:	mittelflach
	Fleischfarbe:	gelb
	Schale:	gelb
Stängel	mittelhoch, mitteldeckend, mittelstark pigmentiert	
Blatt	grauhellgrün	
Blüten	crème, selten blühend	

1. Caractères morphologiques

Tubercule	forme:	oblongue courte à ronde
	taille:	moyenne
	yeux:	mi-superficiels
	chair:	jaune
	peau:	jaune
Tige	de taille moyenne, port mi-étalé, avec pigmentation moyenne	
Feuille	vert grisâtre clair, moyenne	
Fleur	crème, floraison très rare	

2. Werteigenschaften

Ertrag:	mittel bis ziemlich hoch
Kalibrierungsbeute:	mittel
Stärkegehalt:	hoch (15-18%)
Stärkeertrag:	hoch
Kochtyp:	C - B
Verfärbung	
roh:	mittel
gekocht:	mittel bis gering
Reduzierende Zucker:	sehr gering (0,03 bis 0,07%, TS)
Verarbeitungseignung:	Chips
Vorkeimdauer:	6 Wochen

3. Anfälligkeiten

Krebs:	nicht anfällig
Nematoden:	nicht anfällig (Pathotyp Ro ₁)
Krautfäule:	ziemlich stark
Braunfäule:	mittel
Flachschorf:	mittel bis gering
Pulverschorf:	mittel bis stark
Eisenfleckigkeit:	gering
Blattroll:	mittel
Virus Y:	stark
Schlagempfindlichkeit:	mittel bis gering
Abkeimungs- empfindlichkeit:	gering

4. Besondere Hinweise

Die Knollen sind keimrufig und lagern sich gut. Sie benötigt eine etwas höhere N-Versorgung. Eine Reduktion in der Pflanzdichte bewirkt eine verbesserte Ausbeute im geforderten Kaliber.

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement:	moyen à assez élevé
Calibre commercial:	moyen
Teneur en amidon:	élevée (15-18%)
Rendement amidon:	élevé
Type culinaire:	C - B
Altération de la couleur	
chair crue:	moyenne
chair cuite:	moyenne à faible
Sucres réducteurs (teneur):	très faible (0,03 à 0,07%, MS)
Utilisation technologique:	chips
Prégermination:	6 semaines

3. Sensibilités

Galle verruqueuse:	résistante
Nématodes:	résistante au pathotype Ro ₁
Mildiou des fanes:	assez élevée
Mildiou des tubercules:	moyenne
Gale commune:	moyenne à faible
Gale poudreuse:	moyenne à élevée
Taches de rouille:	faible
Virus de l'enroulement:	moyenne
Virus Y:	élevée
Sensibilité aux chocs:	moyenne à faible
Sensibilité à l'égermage:	faible

4. Remarques particulières

Lady Claire a une bonne dormance et les tubercules se conservent bien. Elle est assez exigeante en azote. Pour obtenir des tubercules de grande taille, il est recommandé de diminuer la densité de plantation.

Lady Claire ist eine frühreife Chipssorte mit einer ausgezeichneten Backqualität.

Lady Claire est une variété assez précoce avec une très bonne aptitude à la transformation en chips.

Lady Jane

Autorinnen und Autoren: Mout De Vrieze,
Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche
und Patrice de Werra
Gemeinsames Werk von Agroscope,
swissem in Delley und der swisspatat in Bern

November 2024

Auteurs et Autrices: Mout De Vrieze,
Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche
et Patrice de Werra
Œuvre commune d'Agroscope,
de swissem à Delley et de swisspatat à Berne

Novembre 2024

Kartoffeln		Pommes de terre
Verarbeitungssorte		Variété pour l'industrie alimentaire
Reifegruppe	mittelfrüh bis mittelspät/ mi-précoce à mi-tardive	Maturité
Züchter	Meijer (NL)	Obtenteur
Abstammung	Agria × CMK2005-709-005	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2025	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	swissem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/ Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	kurzoval bis lang
	Grösse:	mittel
	Augen:	flach
	Fleischfarbe:	hellgelb bis gelb
	Schale:	gelb
Stängel	hoch, aufrecht, mittelpigmentiert	
Blatt	dunkelgrün, lanzettenförmig	
Blüten	violett	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme:	oblongue courte à longue
	taille:	moyenne
	yeux:	superficiels
	chair:	jaune à jaune clair
	peau:	jaune
Tige	taille haute, mi-dressée avec pigmentation moyenne	
Feuille	verte foncée, lancéolée	
Fleur	violette	

Lady Jane

2. Werteigenschaften	
Ertrag	hoch
Kalibrierbeute	hoch
Stärkegehalt	mittel (14–17 %)
Stärkeertrag	mittel
Kochtyp	C
Verfärbungen	roh: mittel gekocht: mittel
Reduzierende Zucker	mittel
Verarbeitungseignung	Pommes frites

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques	
Rendement	élevé
Calibre commercial	élevé
Teneur en amidon	moyenne (14–17 %)
Rendement amidon	moyen
Type culinaire	C
Altération de la couleur	chair crue: moyenne chair cuite: moyenne
Sucres réducteurs	moyenne
Utilisation technologique	frites

3. Anfälligkeiten	
Krebs	Resistent
Nematoden	Resistent (Ro ₁ , Ro ₄)
Krautfäule	sehr gering
Knollenfäule	gering
Flachschorf	gering
Pulverschorf	hoch
Eisenfleckigkeit	gering
Blattroll	gering
Virus Y	mittel bis gering
Schlagempfindlichkeit	mittel

3. Sensibilités	
Galle verruqueuse	résistante
Nématodes	résistante (Ro ₁ , Ro ₄)
Mildiou des fanes	très faible
Mildiou des tubercules	faible
Gale commune	faible
Gale poudreuse	élevé
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	faible
Virus Y	moyenne à faible
Sensibilité aux chocs	moyenne

4. Besondere Hinweise

4. Remarques particulières

Lady Jane

Lady Jane

Impressum

Herausgeber
Auskünfte

Agroscope, www.agroscope.ch
Mout de Vrieze, Agroscope,
mout.devrieze@agroscope.admin.ch

Redaktion
Gestaltung
Fotos
Copyright


Andrea Leuenberger, Agroscope
Christoph Meichtry, Valmedia AG, Visp
Carole Parodi, Mout de Vrieze, Agroscope
© Agroscope 2024

Pomme de terre
Variété de consommation

Lady Rosetta

Kartoffeln
Speisesorte

Maturité	mittelfrüh bis mittelspät <i>mi-précoce à mi-tardive</i>	Reifegruppe
Obtenteur	C. Meijer B.V. NL-4411 RK Rilland	Züchter
Ascendance	Cardinal x SVP (VTn) ² 62-33-3	Abstammung
Inscription sur la liste suisse	1999	Aufnahme in die Sortenliste
Représentant	Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband Ass. suisse des producteurs de semences CH - 1567 Delley	Vertreter



1.	Caractères morphologiques	1.	Morphologische Merkmale
Tubercule :	forme : ronde taille : moyenne yeux : superficiels chair : jaune clair peau : rouge (rugueuse)	Knolle :	Form : rund Grösse : mittelgrossfallend Augen : flach Fleischfarbe : hellgelb Schale : rot (rauh)
Tige :	de taille moyenne, port mi-dressé, avec pigmentation	Stengel :	mittelhoch, mittelaufrecht, pigmentiert
Feuille :	vert clair, petites folioles	Blatt :	hellgrün, kleine Fiederblättchen
Fleur :	violacée, floraison rare	Blüten :	rotviolett, wenig blühend

2.	Caractéristiques agronomiques et technologiques	2.	Werteigenschaften
<i>Rendement :</i> <i>Calibre :</i> <i>Teneur en amidon :</i> <i>Rendement amidon :</i> <i>Type culinaire :</i> <i>Altération de la couleur</i> - <i>chair crue :</i> - <i>chair cuite :</i> <i>Sucres réducteurs (teneur):</i> <i>Utilisation technologique :</i>	<i>moyen</i> <i>élevé</i> <i>élevée (17 - 19%)</i> <i>élevé</i> <i>C</i> <i>moyenne</i> <i>moyenne à faible</i> <i>faible</i> <i>chips</i>	<i>Ertrag :</i> <i>Kalibrierbeute :</i> <i>Stärkegehalt :</i> <i>Stärkeertrag :</i> <i>Kochtyp :</i> <i>Verfärbung</i> - <i>roh :</i> - <i>gekocht :</i> <i>Reduzierende Zucker :</i> <i>Verarbeitungseignung :</i>	<i>mittel</i> <i>hoch</i> <i>hoch (17 - 19%)</i> <i>hoch</i> <i>C</i> <i>mittel</i> <i>mittel bis gering</i> <i>wenig</i> <i>Chips</i>

3.	Sensibilités	3.	Anfälligkeiten
<i>Galle verruqueuse :</i> <i>Nématodes :</i> <i>Mildiou des fanes :</i> <i>Mildiou des tubercules :</i> <i>Gale commune :</i> <i>Gale poudreuse :</i> <i>Taches de rouille :</i> <i>Virus de l'enroulement :</i> <i>Virus Y :</i> <i>Sensibilité aux chocs :</i> <i>Sensibilité à l'égermage :</i>	<i>sensible</i> <i>résistante au Pathotype Ro₁</i> <i>assez élevée</i> <i>moyenne</i> <i>faible</i> <i>faible</i> <i>faible</i> <i>moyenne</i> <i>moyenne à élevée</i> <i>élevée</i> <i>faible</i>	<i>Krebs :</i> <i>Nematoden :</i> <i>Krautfäule :</i> <i>Braunfäule :</i> <i>Flachschorf :</i> <i>Pulverschorf :</i> <i>Eisenfleckigkeit :</i> <i>Blattroll :</i> <i>Virus Y :</i> <i>Schlagempfindlichkeit :</i> <i>Abkeimungsempfindlichkeit :</i>	<i>anfällig</i> <i>nicht anfällig Pathotyp Ro₁</i> <i>ziemlich stark</i> <i>mittel</i> <i>gering</i> <i>gering</i> <i>gering</i> <i>mittel</i> <i>mittel bis stark</i> <i>hoch</i> <i>gering</i>

4.	Remarques particulières	4.	Besondere Hinweise
	<i>Réfractaire au virus X et</i> <i>résistante au virus A. Lady</i> <i>Rosetta a une dormance assez</i> <i>courte.</i>		<i>Immun gegen Virus X, resistent</i> <i>gegen Virus A. Ziemlich kurze</i> <i>Keimruhe.</i>

Lady Rosetta est une variété riche en amidon qui convient à la fabrication de chips.

Lady Rosetta ist eine stärkereiche Sorte, die sich gut für die Chipsherstellung eignet.

Oeuvre commune des Stations fédérales de recherches agronomiques de Changins et de Reckenholz, de l'Association suisse des producteurs de semences à Delley et de swisspatat à Guin.

Gemeinsames Werk der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten Reckenholz und Changins, des Schweizerischen Saatgutproduzenten-Verbandes Delley und der swisspatat in Düringen.

Kartoffeln

Speisesorte

Reifegruppe

Züchter

Abstammung

Aufnahme in die Sortenliste

Vertreter

Laura

mittelfrüh bis mittelspät/
mi-précoce à mi-tardive

Europlant, D-21337 Lüneburg

783/89/3566 × 6140/12

2007

swissem

Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/

*Association suisse des producteurs
de semences*

CH-1567 Delley

Pommes de terre

Variété de consommation


Maturité

Obtenteur

Ascendance

*Inscription
sur la liste suisse*

Représentant



1. Morphologische Merkmale

Knolle	Form:	kurzoval bis langoval
	Grösse:	mittelgrossfallend und sehr regelmässig
	Augen:	flach
	Fleischfarbe:	tiefgelb
	Schale:	ausgeprägt rot
Stängel	hoch, aufrecht, leicht pigmentiert	
Blatt	grün, mittel	
Blüten	cremeviolett, selten bis mittel blühend	

1. Caractères morphologiques

Tubercule	forme:	oblongue courte à oblongue
	taille:	moyenne et très régulière
	yeux:	superficiels
	chair:	jaune foncé
	peau:	rouge vif
Tige	de taille haute, port dressé, avec légère pigmentation	
Feuille	verte, moyenne	
Fleur	violet crème, floraison rare à moyenne	

2. Werteigenschaften

Ertrag:	hoch
Kalibrierungsbeute:	hoch
Stärkegehalt:	mittel (12-14%)
Stärkeertrag:	mittel
Kochtyp:	B
Verfärbung	
roh:	mittel
gekocht:	gering
Reduzierende Zucker:	mittel (1,03% TS)
Verarbeitungseignung:	Frites
Vorkeimdauer:	6 Wochen

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement:	élevé
Calibre commercial:	élevé
Teneur en amidon:	moyenne (12-14%)
Rendement amidon:	moyen
Type culinaire:	B
Altération de la couleur	
chair crue:	moyenne
chair cuite:	faible
Sucres réducteurs	moyenne
(teneur):	(1,03% MS)
Utilisation technologique:	frites
Prégermination:	6 semaines

3. Anfälligkeiten

Krebs:	nicht anfällig
Nematoden:	nicht anfällig (Pathotyp Ro ₁ bis Ro ₅)
Krautfäule:	mittel
Braunfäule:	ziemlich gering bis mittel
Flachschorf:	mittel
Pulverschorf:	gering
Eisenfleckigkeit:	mittel
Blattroll:	mittel bis gering
Virus Y:	gering
Schlagempfindlichkeit:	gering
Abkeimungs- empfindlichkeit:	gering

3. Sensibilités

Galle verruqueuse:	résistante
Nématodes:	résistante aux pathotypes Ro ₁ à Ro ₅
Mildiou des fanes:	moyenne
Mildiou des tubercules:	assez faible à moyenne
Gale commune:	moyenne
Gale poudreuse:	faible
Taches de rouille:	moyenne
Virus de l'enroulement:	moyenne à faible
Virus Y:	faible
Sensibilité aux chocs:	faible
Sensibilité à l'égermage:	faible

4. Besondere Hinweise

Laura hat eine ausgesprochen starke Keimruhe. Die Vorkeimung des Pflanzgutes ist daher empfohlen.

4. Remarques particulières

Laura a une dormance prononcée.
Il est recommandé de prégermer les plants.

Laura ist eine mittelfrühe, rotschalige Speisesorte. Ihre Knollen lagern sich gut und eignen sich zur Herstellung von Rösti und Pommes frites

Laura est une variété mi-précoce de consommation à peau rouge vif. Elle se conserve bien et se prête à la fabrication de rösti et de frites.

Pomme de terre
Variété pour l'industrie alimentaire

Markies

Kartoffeln
Verarbeitungssorte

Maturité	mittelspät mi-tardive	Reifegruppe
Obtenteur	Mansholt / Agrico NL-8300 AB Emmeloord	Züchter
Ascendance	Fianna x Agria	Abstammung
Inscription sur la liste suisse	1998	Aufnahme in die Sortenliste
Représentant	Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband Ass. suisse des producteurs de semences CH - 1567 Delley	Vertreter



1.	Caractères morphologiques	1.	Morphologische Merkmale
Tubercule :	forme : oblongue courte à oblongue taille : grosse yeux : mi-superficiels chair : jaune peau : jaune	Knolle :	Form : kurzoval bis langoval Grösse : grossfallend Augen : mittelflach Fleischfarbe : gelb Schale : gelb
Tige :	de haute taille, port mi-dressé, avec forte pigmentation	Stengel :	hoch, mittelaufrecht, stark pigmentiert
Feuille :	vert grisâtre	Blatt :	graugrün
Fleur :	blanche, floraison abondante	Blüten :	weiss, stark blühend

2.	Caractéristiques agronomiques et technologiques	2.	Werteigenschaften
Rendement : Calibre : Teneur en amidon : Rendement amidon : Type culinaire : Altération de la couleur - chair crue : - chair cuite : Sucres réducteurs (teneur): Utilisation technologique :	élevé élevé moyenne (13 - 15,5%) moyen C-B faible moyenne très faible frites	Ertrag : Kalibrierenausbeute : Stärkegehalt : Stärkeertrag : Kochtyp : Verfärbung - roh : - gekocht : Reduzierende Zucker : Verarbeitungseignung :	hoch hoch mittel (13 - 15,5%) mittel C-B niedrig mittel sehr niedrig Frites
3.	Sensibilités	3.	Anfälligkeiten
Galle verruqueuse : Nématodes : Mildiou des fanes : Mildiou des tubercules : Gale commune : Gale poudreuse : Taches de rouille : Virus de l'enroulement : Virus Y : Sensibilité aux chocs : Sensibilité à l'égermage :	sensible pas sensible aux pathotypes Ro ₁ , Ro ₄ faible faible moyenne très sensible faible à moyenne faible faible faible moyenne	Krebs : Nematoden : Krautfäule : Braunfäule : Flachschorf : Pulverschorf : Eisenfleckigkeit : Blattroll : Virus Y : Schlagempfindlichkeit : Abkeimungsempfindlichkeit :	anfällig nicht anfällig (Pathotypen Ro ₁ , Ro ₄) gering gering mittel sehr anfällig schwach bis mittel gering gering gering mittel
4.	Remarques particulières	4.	Besondere Hinweise
	La dormance est assez longue. Bonne conservation.		Ziemlich lange Keimruhe. Gute Lagerung.
Markies est une variété mi-tardive destinée à la transformation en frites.		Markies ist eine mittelspäte Sorte für die technische Verarbeitung.	

Oeuvre commune des Stations fédérales de recherches agronomiques de Changins et de Reckenholz, de l'Association suisse des producteurs de semences à Delley et swisspatat à Guin.

Gemeinsames Werk der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten Reckenholz und Changins, des Schweizerischen Saatgutproduzenten-Verbandes Delley und der swisspatat in Düringen.

Odysseus

Autorinnen und Autoren

Mout De Vrieze, Benjamin Hauser, Leonardo Piva,
Christian Vetterli, Patrice de Werra

Gemeinsames Werk von Agroscope,
swissem in Delley und der swisspatat in Bern

Dezember 2025

Autrices et auteurs

Mout De Vrieze, Benjamin Hauser, Leonardo Piva,
Christian Vetterli, Patrice de Werra

Œuvre commune d'Agroscope,
swissem à Delley et de swisspatat à Bern

Décembre 2025

Kartoffeln		Pommes de terre
Verarbeitungssorte		Variété pour l'industrie alimentaire
Reifegruppe	mittelspät/ mi-tardive	Maturité
Züchter	Solana (DE)	Obtenteur
Abstammung	SA 05-506-2 × Opal	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2026	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	swissem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/ Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	rund
	Grösse:	gross
	Augen:	flach
	Fleischfarbe:	gelb
	Schale:	gelb
Stängel	mittelhoch, mittelaufrecht, nicht pigmentiert	
Blatt	mittelgrün, klein	
Blüten	weiss	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme:	ronde
	taille:	grande
	yeux:	superficiels
	chair:	jaune
	peau:	jaune
Tige	taille moyenne, mi-dressée, sans pigmentation	
Feuille	vert franc, petite	
Fleur	blanche	

Odysseus

2. Werteigenschaften	
Ertrag	hoch
Kalibrierbeute	hoch
Stärkegehalt	mittel (15–19 %)
Stärkeertrag	gering bis mittel
Kochtyp	B–C
Verfärbungen	roh: mittel gekocht: gering
Reduzierende Zucker	eher gering
Verarbeitungseignung	Chips

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques	
Rendement	élevée
Calibre commercial	élevé
Teneur en amidon	moyenne (15–19 %)
Rendement amidon	faible à moyenne
Type culinaire	B–C
Altération de la couleur	chair crue: moyenne chair cuite: faible
Sucres réducteurs	assez faible
Utilisation technologique	Chips

3. Anfälligkeiten	
Krebs	keine Information vorhanden
Nematoden	Resistent (Ro ₁)
Krautfäule	gering bis mittel
Knollenfäule	mittel
Flachschorf	gering
Pulverschorf	gering
Eisenfleckigkeit	gering
Blattroll	gering bis mittel
Virus Y	mittel, Y ^{NTN} gering
Schlagempfindlichkeit	gering bis mittel

3. Sensibilités	
Galle verruqueuse	pas d'information disponible
Nématodes	résistante (Ro ₁)
Mildiou des fanes	faible à moyenne
Mildiou des tubercules	moyenne
Gale commune	faible
Gale poudreuse	faible
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	faible à moyenne
Virus Y	moyenne, Y ^{NTN} faible
Sensibilité aux chocs	faible à moyenne

4. Besondere Hinweise

4. Remarques particulières

Odysseus

Odysseus

Impressum

Herausgeber Agroscope, www.agroscope.ch
 Auskünfte Mout De Vrieze, Agroscope
mout.devrieze@agroscope.admin.ch
 Redaktion Andrea Leuenberger, Agroscope
 Gestaltung Christoph Meichtry, Valmedia AG, Visp
 Fotos Carole Parodi, Mout De Vrieze, Agroscope; © Solana Gruppe
 Copyright © Agroscope 2025

Kartoffeln

Pirol

Pommes de terre

Verarbeitungssorte

Reifegruppe

Züchter

Abstammung

Aufnahme in die Sortenliste

Vertreter

mittelfrüh bis mittelspät/*mi-précoce*

Norika, D-18190 Gross Lüsewitz

Agria × 1.214.226-84

2008

swissem
Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/
*Association suisse des producteurs
de semences*
1567 Delley

*Variété pour l'industrie
alimentaire*

Maturité

Obtenteur

Ascendance

*Inscription
sur la liste suisse*

Représentant



1. Morphologische Merkmale

Knolle	Form:	kurzoval bis rund, regelmässig
	Grösse:	mittelgrossfallend
	Augen:	flach bis mittelflach
	Fleischfarbe:	gelb
	Schale:	gelb bis hellgelb, rauh
Stängel	hoch, mittelaufrecht, leicht pigmentiert	
Blatt	gross, glatt, etwas platt	
Blüten	weiss, selten blühend	

1. Caractères morphologiques

Tubercule	forme:	oblongue courte à ronde, régulière
	taille:	moyenne
	yeux:	superficiels à mi-superficiels
	chair:	jaune
	peau:	jaune à jaune clair, rugueuse
Tige	de taille haute, port mi-dressé, avec légère pigmentation	
Feuille	grande, lisse, plane	
Fleur	blanche, floraison rare	

2. Werteigenschaften

Ertrag:	ziemlich hoch
Kalibrierbeute:	hoch
Stärkegehalt:	hoch (16-18%)
Stärkeertrag:	hoch
Kochtyp:	C-B
Verfärbungen	
roh:	gering
gekocht:	mittel
Reduzierende Zucker:	sehr gering (0,07% TS)
Verarbeitungseignung:	Chips
Vorkeimdauer:	4-5 Wochen

3. Anfälligkeiten

Krebs:	nicht anfällig
Nematoden:	nicht anfällig
	Pathotyp Ro _{1,4}
Krautfäule:	ziemlich stark
Braunfäule:	gering
Flachschorf:	mittel
Pulverschorf:	gering bis mittel
Eisenfleckigkeit:	gering
Blattroll:	mittel
Virus Y:	gering bis mittel
Schlagempfindlichkeit:	mittel
Abkeimungs- empfindlichkeit:	gering

4. Besondere Hinweise

Pirol lagert sich ziemlich gut.

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement:	assez élevé
Calibre commercial:	élevé
Teneur en amidon:	élevée (16-18%)
Rendement amidon:	élevé
Type culinaire:	C-B
Altération de la couleur	
chair crue:	faible
chair cuite:	moyenne
Sucres réducteurs (teneur):	très faible (0,07% MS)
Utilisation technologique:	chips
Prégermination:	4-5 semaines

3. Sensibilités

Galle verruqueuse:	résistante
Nématodes:	résistante
	aux pathotypes Ro _{1,4}
Mildiou des fanes:	assez élevée
Mildiou des tubercules:	faible
Gale commune:	moyenne
Gale poudreuse:	faible à moyenne
Taches de rouille:	faible
Virus de l'enroulement:	moyenne
Virus Y:	faible à moyenne
Sensibilité aux chocs:	moyenne
Sensibilité à l'égermage:	faible

4. Remarques particulières

Pirol se conserve assez bien.

Pirol ist eine mittelfrühe Verarbeitungssorte mit einer ausgezeichneten Pommes Chips Qualität. Der Gehalt an reduzierenden Zucker ist sehr tief.

Pirol est une variété mi-précoce qui se prête très bien à la transformation en chips. Sa teneur en sucres réducteurs est très faible.

Queen Anne

Kartoffeln		Pommes de terre
Speisesorte		Variété de consommation
Reifegruppe	mittelfrüh / mi-précoce	Maturité
Züchter	Solana (D)	Obtenteur
Abstammung	99-002-14 x Gala	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2018	Inscription dans la liste suisse
Vertreter	swissem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/ Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form	langoval
	Grösse	eher grossfallend
	Augen	flach
	Fleischfarbe	gelb
	Schale	gelb
Stängel	hoch, mittelaufrecht, Stängelbasis pigmentiert	
Blatt	klein, grün	
Blüten	weiss, schwach bis mittelblühend	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme	oblongue
	taille	plutôt grosse
	yeux	superficiels
	chair	jaune
	peau	jaune
Tige	de haute taille, mi-dressée, pigmentation à la base des tiges	
Feuille	petite, vert franc	
Fleur	blanche, rare à moyenne	

Queen Anne

2. Werteigenschaften

Ertrag	sehr hoch
Kalibrierungsbeute	hoch
Stärkegehalt	niedrig (10–12 %)
Stärkeertrag	niedrig
Kochtyp	B–A
Verfärbungen	roh: mittel gekocht: mittel
Reduzierende Zucker	hoch
Verarbeitungseignung	keine
Vorkeimdauer	4–5 Wochen
Primeur	10–12 Wochen

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement	très élevé
Calibre commercial	élevé
Teneur en amidon	faible (10–12 %)
Rendement amidon	faible
Type culinaire	B–A
Altération de la couleur	chair crue: moyenne chair cuite: moyenne
Sucres réducteurs	élevés
Utilisation technologique	néant
Prégermination	4–5 semaines
Primeur	10–12 semaines

3. Anfälligkeiten

Krebs	nicht anfällig 1
Nematoden	nicht anfällig (Ro _{1,4})
Krautfäule	stark
Knollenfäule	mittel bis gering
Flachschorf	gering
Pulverschorf	stark
Eisenfleckigkeit	gering
Blattroll	mittel
Virus Y	gering
Schlagempfindlichkeit	gering

3. Sensibilités

Galle verruqueuse	résistante 1
Nématodes	résistante (Ro _{1,4})
Mildiou des fanes	moyenne à assez élevé
Mildiou des tubercules	moyenne
Gale commune	élevée
Gale poudreuse	faible
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	faible
Virus Y	faible
Sensibilité aux chocs	moyenne

4. Besondere Hinweise

Die Knollen sind gut keimruhig. Die Sorte ist ziemlich anfällig für ein Ergrünen der Knollen.

4. Remarques particulières

Queen Anne a une bonne dormance. Elle est assez sensible au verdissement.

Queen Anne ist eine mittelfrühe, ziemlich festkochende Sorte.

Queen Anne est une variété mi-précoce, assez ferme.

SH C 1010

Autoren: Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche und Patrice de Werra
Gemeinsames Werk von Agroscope, swissem in Delley und der swisspatat in Bern

November 2022

Auteurs: Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche et Patrice de Werra
Œuvre commune d'Agroscope, de swissem à Delley et de swisspatat à Berne

Novembre 2022

Kartoffeln		Pommes de terre
Speisesorte		Variété de consommation
Reifegruppe	mittelfrüh – mittelspät / mi-précoce – mi tardive	Maturité
Züchter	Stet Holland / Pays-Bas	Obtenteur
Abstammung	Omega × VR 808	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2021	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	swissem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband / Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	rund, etwas platt
	Grösse:	mittel
	Augen:	mittelflach
	Fleischfarbe:	gelb
	Schale:	dunkelgelb, rauh
Stängel	mittelhoch, mittelaufrecht, nicht pigmentiert	
Blatt	grün	
Blüten	hellblau-lila farbig, wenig bis mittelblühend	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme:	ronde, un peu aplatie
	taille:	moyenne
	yeux:	mi-superficiels
	chair:	jaune
	peau:	jaune foncé, rugueuse
Tige	taille moyenne, mi-dressée, sans pigmentation	
Feuille	vert franc	
Fleur	mauve, peu à moyenne	

SH C 1010

2. Werteigenschaften	
Ertrag	mittel bis hoch
Kalibrierausbeute	hoch
Stärkegehalt	mittel (17,5–21,5 %)
Stärkeertrag	hoch
Kochtyp	C–D
Verfärbungen	roh: mittel gekocht: mittel
Reduzierende Zucker	gering
Verarbeitungseignung	Chips

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques	
Rendement	moyen à élevé
Calibre commercial	élevé
Teneur en amidon	moyenne (17,5–21,5 %)
Rendement amidon	élevé
Type culinaire	C–D
Altération de la couleur	chair crue: moyenne chair cuite: moyenne
Sucres réducteurs	faible
Utilisation technologique	chips

3. Anfälligkeiten	
Krebs	resistent
Nematoden	resistent (Ro ₁)
Krautfäule	mittel
Knollenfäule	hoch
Flachschorf	gering
Pulverschorf	gering
Eisenfleckigkeit	gering
Blattroll	gering
Virus Y	mittel bis gering
Schlagempfindlichkeit	hoch

3. Sensibilités	
Galle verruqueuse	résistante
Nématodes	résistante (Ro ₁)
Mildiou des fanes	moyenne
Mildiou des tubercules	élevée
Gale commune	faible
Gale poudreuse	faible
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	faible
Virus Y	moyen à faible
Sensibilité aux chocs	élevée

4. Besondere Hinweise
Die Knollen sind anfällig auf Gefässbündelverfärbung und können etwas hohlherzig sein.

4. Remarques particulières
Les tubercules sont sensibles à la decoloration des faisceaux vasculaires et peuvent avoir quelques cœurs creux.

SH C 1010 lässt sich kalt lagern bei 4 °C.

SH C 1010 se conserve à basse température à 4 °C.

Impressum

Herausgeber
Auskünfte
Redaktion
Gestaltung
Fotos
Copyright

Agroscope, www.agroscope.ch
Ruedi Schwärzel, Agroscope,
ruedi.schwaerzel@agroscope.admin.ch
Andrea Leuenberger, Agroscope
Christoph Meichtry, Valmedia AG, Visp
Carole Parodi, Agroscope
© Agroscope 2022

Simonetta


Autoren: Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche und Patrice de Werra
Gemeinsames Werk von Agroscope, swissem in Delley und der swisspatat in Bern

November 2023

Auteurs: Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche et Patrice de Werra
Œuvre commune d'Agroscope, de swissem à Delley et de swisspatat à Berne

Novembre 2023

Kartoffeln		Pommes de terre
Speisesorte		Variété de consommation
Reifegruppe	mittelfrüh bis mittelspät / mi-précoce à mi-tardive	Maturité
Züchter	Europlant (D)	Obtenteur
Abstammung	unbekannt / inconnu	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2024	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	swissem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband / Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	oval
	Grösse:	mittel
	Augen:	flach
	Fleischfarbe:	gelb
	Schale:	gelb
Stängel	mittelhoch, mittelaufrecht, leicht pigmentiert	
Blatt	hellgrün, lanzettenförmig	
Blüten	creme, sehr selten	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme:	oblongue
	taille:	moyenne
	yeux:	superficiels
	chair:	jaune
	peau:	jaune
Tige	taille moyenne, mi-dressée avec légère pigmentation	
Feuille	vert clair lencéolé	
Fleur	crème, très rare	

Simonetta

2. Werteigenschaften	
Ertrag	hoch
Kalibrierausbeute	hoch
Stärkegehalt	mittel (10–14 %)
Stärkeertrag	mittel
Kochtyp	B–A
Verfärbungen	roh: wenig gekocht: wenig
Reduzierende Zucker	
Verarbeitungseignung	keine

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques	
Rendement	élevé
Calibre commercial	élevé
Teneur en amidon	moyenne (10–14 %)
Rendement amidon	moyen
Type culinaire	B–A
Altération de la couleur	chair crue: faible chair cuite: faible
Sucres réducteurs	
Utilisation technologique	néant

3. Anfälligkeiten	
Krebs	anfällig
Nematoden	resistent (Ro ₁ , Ro ₄)
Krautfäule	mittel
Knollenfäule	mittel
Flachschorf	mittel
Pulverschorf	hoch
Eisenfleckigkeit	gering
Blattroll	mittel
Virus Y	hoch, Y ^{NTN} hoch
Schlagempfindlichkeit	gering

3. Sensibilités	
Galle verruqueuse	sensible
Nématodes	résistante (Ro ₁ , Ro ₄)
Mildiou des fanes	moyenne
Mildiou des tubercules	moyenne
Gale commune	moyenne
Gale poudreuse	élevée
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	moyenne
Virus Y	élevée, Y ^{NTN} élevée
Sensibilité aux chocs	faible

4. Besondere Hinweise
Gute Lagereignung. Die Knollen ergrünen am Licht rasch.

4. Remarques particulières
Bonne conservation. Les tubercules sont sensibles au verdissement.

Simonetta ist eine mittelfrühe bis mittelspäte, ziemlich festkochende Sorte, die gut gelagert werden kann.

Simonetta est une variété mi-précoce à mi-tardive, plutôt ferme, qui se conserve bien.

Impressum

Herausgeber
Auskünfte

Agroscope, www.agroscope.ch
Ruedi Schwärzel, Agroscope,
ruedi.schwaerzel@agroscope.admin.ch

Redaktion
Gestaltung
Fotos
Copyright

Andrea Leuenberger, Agroscope
Christoph Meichtry, Valmedia AG, Visp
Carole Parodi, Agroscope
© Agroscope 2023

Sorentina


Autoren: Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche und Patrice de Werra
Gemeinsames Werk von Agroscope, swissem in Delley und der swisspatat in Bern

November 2021

Auteurs: Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche et Patrice de Werra
Œuvre commune d'Agroscope, de swissem à Delley et de swisspatat à Berne

Novembre 2021

Kartoffeln		Pommes de terre
Verarbeitungssorte		Variété pour l'industrie alimentaire
Reifegruppe	mittelfrüh bis mittelspät / mi-précoce à mi-tardive	Maturité
Züchter	Europlant (D)	Obtenteur
Abstammung	unbekannt / inconnue	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2022	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	swissem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband / Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	rund bis kurzoval
	Grösse:	mittel
	Augen:	mittelflach bis flach
	Fleischfarbe:	hellgelb bis gelb
	Schale:	gelb, gross genetzt
Stängel	hoch, aufrecht, sehr leicht pigmentiert an der Stängelbasis	
Blatt	kleine, lanzettenförmige Blättchen	
Blüten	blüht nicht	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme:	ronde à oblongue-courte
	taille:	moyenne
	yeux:	mi-superficiels à superficiels
	chair:	jaune clair à jaune
	peau:	jaune, réticulée
Tige	de taille haute, dressée, très légère pigmentation à la base des tiges	
Feuille	petites folioles lencéolées	
Fleur	pas d'observation de fleurs	

Sorentina

2. Werteigenschaften

Ertrag	mittel
Kalibrierausbeute	mittel
Stärkegehalt	hoch (16–20 %)
Stärkeertrag	hoch
Kochtyp	C–B
Verfärbungen	roh: mittel gekocht: mittel
Reduzierende Zucker	sehr gering (< 0,10 g / 100 g)
Verarbeitungseignung	Chips
Vorkeimdauer	6 Wochen

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement	moyen
Calibre commercial	moyen
Teneur en amidon	élevée (16–20 %)
Rendement amidon	élevé
Type culinaire	C–B
Altération de la couleur	chair crue: moyenne chair cuite: moyenne
Sucres réducteurs	très faibles (< 0,10 g / 100 g)
Utilisation technologique	chips
Prégermination	6 semaines

3. Anfälligkeiten

Krebs	resistent
Nematoden	resistent (Ro1 und Ro4)
Krautfäule	ziemlich hoch
Knollenfäule	mittel
Flachschorf	mittel
Pulverschorf	mittel bis gering
Eisenfleckigkeit	gering
Blattroll	mittel
Virus Y	hoch bis mittel
Schlagempfindlichkeit	mittel bis hoch

3. Sensibilités

Galle verruqueuse	résistante
Nématodes	résistante (Ro1 et Ro4)
Mildiou des fanes	assez élevée
Mildiou des tubercules	moyenne
Gale commune	moyenne
Gale poudreuse	moyenne à faible
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	moyenne
Virus Y	élevée à moyenne
Sensibilité aux chocs	moyenne à élevée

4. Besondere Hinweise

Die Knollen sind geeignet für eine längere Lagerung bei tiefen Temperaturen (4 °C).

4. Remarques particulières

Les tubercules peuvent être conservées durant une longue période à basse température (4 °C).

Sorentina ist eine mittelfrühe bis mittelspäte Chipssorte mit wenig reduzierenden Zuckern, die bei tiefen Temperaturen gelagert werden kann.

Sorentina est une variété chips mi-précoce à mi-tardive avec un faible taux de sucres réducteurs, qui peut être conservée à basse température.

Impressum

Herausgeber
Auskünfte
Redaktion
Gestaltung
Fotos
Copyright

Agroscope, www.agroscope.ch
Ruedi Schwärzel, Agroscope,
ruedi.schwaerzel@agroscope.admin.ch
Andrea Leuenberger, Agroscope
Christoph Meichtry, Valmedia AG, Visp
Carole Parodi, Agroscope
© Agroscope 2021

Sound

Autorinnen und Autoren: Mout De Vrieze,
Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche
und Patrice de Werra
Gemeinsames Werk von Agroscope,
swissem in Delley und der swisspatat in Bern

November 2024

Auteurs et Autrices: Mout De Vrieze,
Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche
et Patrice de Werra
Œuvre commune d'Agroscope,
de swissem à Delley et de swisspatat à Berne

Novembre 2024

Kartoffeln		Pommes de terre
Verarbeitungssorte		Variété pour l'industrie alimentaire
Reifegruppe	mittelspät / mi-tardive	Maturité
Züchter	Meijer (NL)	Obtenteur
Abstammung	Mondial × CMK2003 707 003	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2024	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	swissem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband / Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	kurzoval
	Grösse:	mittel
	Augen:	flach
	Fleischfarbe:	hellgelb
	Schale:	gelb
Stängel	mittelhoch, mittelaufrecht, leicht pigmentiert	
Blatt	grün	
Blüten	weiss	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme:	oblongue
	taille:	moyenne
	yeux:	superficiels
	chair:	jaune clair
	peau:	jaune
Tige	taille haute, mi-dressée avec pigmentation	
Feuille	vert franc	
Fleur	blanche	

Sound

2. Werteigenschaften	
Ertrag	hoch
Kalibrierbeute	
Stärkegehalt	mittel (12,5–14 %)
Stärkeertrag	mittel
Kochtyp	B–C
Verfärbungen	roh: mittel gekocht: wenig
Reduzierende Zucker	KI
Verarbeitungseignung	keine

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques	
Rendement	élevé
Calibre commercial	
Teneur en amidon	moyenne (12,5–14 %)
Rendement amidon	moyen
Type culinaire	B–C
Altération de la couleur	chair crue: moyenne chair cuite: moyenne
Sucres réducteurs	pi
Utilisation technologique	néant

3. Anfälligkeiten	
Krebs	resistent
Nematoden	Resistent (Ro ₁)
Krautfäule	sehr gering
Knollenfäule	gering
Flachschorf	mittel
Pulverschorf	mittel bis gering
Eisenfleckigkeit	gering
Blattroll	mittel
Virus Y	hoch, Y ^{NTN} hoch
Schlagempfindlichkeit	hoch

3. Sensibilités	
Galle verruqueuse	résistante
Nématodes	résistante (Ro ₁)
Mildiou des fanes	très faible
Mildiou des tubercules	faible
Gale commune	moyenne
Gale poudreuse	moyenne à faible
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	moyenne
Virus Y	élevé, Y ^{NTN} élevé
Sensibilité aux chocs	élevée

4. Besondere Hinweise

4. Remarques particulières



Impressum	
Herausgeber	Agroscope, www.agroscope.ch
Auskünfte	Mout de Vrieze, Agroscope, mout.devrieze@agroscope.admin.ch
Redaktion	Andrea Leuenberger, Agroscope
Gestaltung	Christoph Meichtry, Valmedia AG, Visp
Fotos	Carole Parodi, Mout de Vrieze, Agroscope
Copyright	© Agroscope 2024

Sunshine

Autoren: Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche und Patrice de Werra
Gemeinsames Werk von Agroscope, swisssem in Delley und swisspatat in Bern

November 2020

Auteurs: Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche et Patrice de Werra
Œuvre commune d'Agroscope, de swisssem à Delley et de swisspatat à Berne

Novembre 2020

Kartoffeln		Pommes de terre
Speisesorte		Variété de consommation
Reifegruppe	mittelfrüh / mi-précoce	Maturité
Züchter	Solana (D)	Obtenteur
Abstammung	unbekannt / inconnue	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2021	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	swisssem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband / Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	langoval
	Grösse:	mittel
	Augen:	flach
	Fleischfarbe:	gelb
	Schale:	gelb
Stängel	mittelhoch bis hoch, aufrecht, ohne Pigmentierung	
Blatt	hellgrün	
Blüten	weiss, sehr schwachblühend	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme:	oblongue à longue
	taille:	moyenne
	yeux:	superficiels
	chair:	jaune
	peau:	jaune
Tige	de taille moyenne à haute, mi-dressée, sans pigmentation	
Feuille	vert clair	
Fleur	blanche, très rare	

Sunshine

2. Werteigenschaften

Ertrag	hoch
Kalibrierausbeute	hoch
Stärkegehalt	mittel (10–13 %)
Stärkeertrag	gering
Kochtyp	B–A
Verfärbungen	roh: mittel gekocht: mittel
Reduzierende Zucker	
Verarbeitungseignung	keine
Vorkeimdauer	4–5 Wochen

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement	élevé
Calibre commercial	élevé
Teneur en amidon	moyenne (10–13 %)
Rendement amidon	faible
Type culinaire	B–A
Altération de la couleur	chair crue: moyenne chair cuite: moyenne
Sucres réducteurs	
Utilisation technologique	aucune
Prégermination	4–5 semaines

3. Anfälligkeiten

Krebs	anfällig
Nematoden	resistent (Ro1)
Krautfäule	mittel bis hoch
Knollenfäule	mittel
Flachschorf	mittel
Pulverschorf	hoch
Eisenfleckigkeit	gering
Blattröll	gering
Virus Y	mittel
Schlagempfindlichkeit	gering

3. Sensibilités

Galle verruqueuse	sensible
Nématodes	résistante (Ro1)
Mildiou des fanes	moyenne à élevée
Mildiou des tubercules	moyenne
Gale commune	moyenne
Gale poudreuse	élevée
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	faible
Virus Y	moyenne
Sensibilité aux chocs	faible

4. Besondere Hinweise

Die Knollen haben eine mittlere Keimruhe. Sie ergrünen am Licht rasch.

4. Remarques particulières

Les tubercules ont une dormance moyenne. Ils sont sensibles au verdissement.

Sunshine ist eine mittelfrühe, ziemlich festkochende Sorte.

Sunshine est une variété mi-précoce, plutôt ferme.

Impressum

Herausgeber
Auskünfte
Redaktion
Gestaltung
Fotos
Copyright

Agroscope, www.agroscope.ch
Ruedi Schwärzel, Agroscope,
ruedi.schwaerzel@agroscope.admin.ch
Andrea Leuenberger, Sibylle Willi, Agroscope
Christoph Meichtry, Valmedia AG, Visp
Agroscope, Carole Parodi
© Agroscope 2020

Thalessa

Autoren: Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche und Patrice de Werra
Gemeinsames Werk von Agroscope, swissem in Delley und der swisspatat in Bern

November 2021

Auteurs: Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche et Patrice de Werra
Œuvre commune d'Agroscope, de swissem à Delley et de swisspatat à Berne

Novembre 2021

Kartoffeln		Pommes de terre
Verarbeitungssorte		Variété pour l'industrie alimentaire
Reifegruppe	mittelfrüh / mi-précoce	Maturité
Züchter	Europlant (D)	Obtenteur
Abstammung	unbekannt / inconnue	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2022	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	swissem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband / Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	kurzoval bis rund
	Grösse:	mittel
	Augen:	mittelflach
	Fleischfarbe:	gelb bis hellgelb
	Schale:	gelb, genetzt
Stängel	hoch, aufrecht, leicht pigmentiert	
Blatt	grün, Blätter nicht glänzend	
Blüten	weiss, blüht mittelmässig	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme:	oblongue-courte à ronde
	taille:	moyenne
	yeux:	mi-superficiels
	chair:	jaune à jaune clair
	peau:	jaune, réticulée
Tige	de haute taille, dressée, très légère pigmentation	
Feuille	franche, mate	
Fleur	blanche, floraison moyenne	

Thalessa

2. Werteigenschaften

Ertrag	mittel bis hoch
Kalibrierausbeute	hoch
Stärkegehalt	hoch (16–20 %)
Stärkeertrag	hoch
Kochtyp	C
Verfärbungen	roh: mittel gekocht: mittel
Reduzierende Zucker	sehr gering (< 0,2 g/100 g)
Verarbeitungseignung	Chips
Vorkeimdauer	6 Wochen

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement	moyen à élevé
Calibre commercial	élevé
Teneur en amidon	élevée (16–20 %)
Rendement amidon	élevé
Type culinaire	C
Altération de la couleur	chair crue: moyenne chair cuite: moyenne
Sucres réducteurs	très faibles (< 0,2 g/100 g)
Utilisation technologique	chips
Prégermination	6 semaines

3. Anfälligkeiten

Krebs	anfällig
Nematoden	resistent (Ro1 und Ro4)
Krautfäule	mittel bis hoch
Knollenfäule	mittel
Flachschorf	mittel bis gering
Pulverschorf	mittel
Eisenfleckigkeit	gering
Blattröll	gering
Virus Y	gering
Schlagempfindlichkeit	mittel bis hoch

3. Sensibilités

Galle verruqueuse	sensible
Nématodes	résistante (Ro1 et Ro4)
Mildiou des fanes	moyenne à élevée
Mildiou des tubercules	moyenne
Gale commune	moyenne à faible
Gale poudreuse	moyenne
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	faible
Virus Y	faible
Sensibilité aux chocs	moyenne à élevée

4. Besondere Hinweise

Die Knollen sind geeignet für eine längere Lagerung bei tiefen Temperaturen (4 °C).

4. Remarques particulières

Les tubercules peuvent être conservées durant une longue période à basse température (4 °C)

Thalessa ist eine mittelfrühe Chipssorte mit wenig reduzierenden Zuckern, die bei tiefen Temperaturen gelagert werden kann.

Thalessa est une variété chips mi-précoce avec un faible taux de sucres réducteurs, qui peut être conservée à basse température.

Impressum

Herausgeber
Auskünfte

Agroscope, www.agroscope.ch
Ruedi Schwärzel, Agroscope,
ruedi.schwaerzel@agroscope.admin.ch

Redaktion
Gestaltung
Fotos
Copyright

Andrea Leuenberger, Agroscope
Christoph Meichtry, Valmedia AG, Visp
Carole Parodi, Agroscope
© Agroscope 2021

Twinner

Autoren: Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche und Patrice de Werra
Gemeinsames Werk von Agroscope, swisssem in Delley und der swisspatat in Bern

November 2023

Auteurs: Ruedi Schwärzel, Jean-Marie Torche et Patrice de Werra
Œuvre commune d'Agroscope, de swisssem à Delley et de swisspatat à Berne

Novembre 2023

Kartoffeln		Pommes de terre
Speisesorte		Variété de consommation
Reifegruppe	früh / précoce	Maturité
Züchter	Agrico (NL)	Obtenteur
Abstammung	MA98-0032 × AR00-87-22	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2023	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	swisssem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband / Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	oval bis kurzoval
	Grösse:	mittel
	Augen:	mittelflach bis flach
	Fleischfarbe:	gelb bis hellgelb
	Schale:	gelb
Stängel	mittelhoch, mittelaufrecht, ohne Pigmentation	
Blatt	hellgrün	
Blüten	weiss, selten	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme:	oblongue à oblongue courte
	taille:	moyenne
	yeux:	mi-superficiels à superficiels
	chair:	jaune à jaune clair
	peau:	jaune
Tige	taille moyenne, mi-dressée, sans pigmentation	
Feuille	vert clair	
Fleur	blanche, rare	

Twinner

2. Werteigenschaften	
Ertrag	mittel
Kalibrierausbeute	mittel
Stärkegehalt	mittel (11–15 %)
Stärkeertrag	mittel
Kochtyp	B
Verfärbungen	roh: mittel gekocht: mittel
Reduzierende Zucker	
Verarbeitungseignung	Hausfrites

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques	
Rendement	moyen
Calibre commercial	moyen
Teneur en amidon	moyenne (11–15 %)
Rendement amidon	moyen
Type culinaire	B
Altération de la couleur	chair crue: moyenne chair cuite: moyenne
Sucres réducteurs	
Utilisation technologique	frites maison

3. Anfälligkeiten	
Krebs	resistent (F1)
Nematoden	resistent (Ro ₁ , Ro ₄)
Krautfäule	sehr wenig
Knollenfäule	wenig
Flachschorf	wenig
Pulverschorf	mittel bis hoch
Eisenfleckigkeit	gering
Blattroll	mittel bis gering
Virus Y	mittel
Schlagempfindlichkeit	gering

3. Sensibilités	
Galle verruqueuse	résistante (F1)
Nématodes	résistante (Ro ₁ , Ro ₄)
Mildiou des fanes	très faible
Mildiou des tubercules	faible
Gale commune	faible
Gale poudreuse	moyenne à élevée
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	moyenne à faible
Virus Y	moyenne
Sensibilité aux chocs	faible

4. Besondere Hinweise
Das Kraut reift früh ab. Gute Lagereignung.

4. Remarques particulières
Le feuillage mûrit rapidement. Bonne aptitude à la conservation.

Twinner ist eine frühe, ziemlich festkochende Sorte.
Sie hat eine gute Krautfäuleresistenz.

Twinner est une variété précoce, plutôt ferme
et très peu sensible au mildiou.


Impressum

Herausgeber
Auskünfte
Redaktion
Gestaltung
Fotos
Copyright

Agroscope, www.agroscope.ch
Ruedi Schwärzel, Agroscope,
ruedi.schwaerzel@agroscope.admin.ch
Andrea Leuenberger, Agroscope
Christoph Meichtry, Valmedia AG, Visp
Carole Parodi, Agroscope
© Agroscope 2023

Venezia

Kartoffeln		Pommes de terre
Speisesorte		Variété de consommation
Reifegruppe	früh / précoce	Maturité
Züchter	Europlant	Obtenteur
Abstammung	B 165/95/82 X P 93-388	Ascendance
Aufnahme in die Sortenliste	2015	Inscription sur la liste suisse
Vertreter	swissem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/ Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	Représentant



1. Morphologische Merkmale		
Knolle	Form:	langoval bis kurzoval, regelmässig
	Grösse:	mittel
	Augen:	flach bis mittelflach
	Fleischfarbe:	gelb bis tiefgelb
	Schale:	gelb
Stängel	mittelhoch, aufrecht, ohne Pigmentierung	
Blatt	grün bis dunkelgrün	
Blüten	weiss, sehr wenig blühend	

1. Caractères morphologiques		
Tubercule	forme:	oblongue à oblongue courte, régulière
	taille:	moyenne
	yeux:	superficiels à mi-superficiels
	chair:	jaune à jaune foncé
	peau:	jaune
Tige	de taille moyenne, dressée, sans pigmentation	
Feuille	vert à vert foncé	
Fleur	blanche, très rare	

Venezia

2. Werteigenschaften

Ertrag	hoch bis mittel
Kalibrierungsbeute	mittel bis hoch
Stärkegehalt	mittel (11–14 %)
Stärkeertrag	mittel
Kochtyp	A–B
Verfärbungen	roh: gering gekocht: gering
Reduzierende Zucker	mittel (1,7 % TS)
Verarbeitungseignung	keine
Vorkeimdauer	4–5 Wochen; Primeur 10–12 Wochen

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement	élevé à moyen
Calibre commercial	moyen à élevé
Teneur en amidon	moyenne (11–14 %)
Rendement amidon	moyen
Type culinaire	A–B
Altération de la couleur	chair crue: faible chair cuite: faible
Sucres réducteurs	moyenne (1,7 % MS)
Utilisation technologique	néant
Prégermination	4–5 semaines; primeur 10–12 semaines

3. Anfälligkeiten

Krebs	anfällig
Nematoden	nicht anfällig (Ro _{1,4})
Krautfäule	mittel bis hoch
Braunfäule	mittel
Flachschorf	gering bis mittel
Pulverschorf	mittel
Eisenfleckigkeit	gering
Blattroll	gering
Virus Y	gering
Schlagempfindlichkeit	gering
Abkeimungsempfindlichkeit	gering

3. Sensibilités

Galle verruqueuse	sensible
Nématodes	résistante (Ro _{1,4})
Mildiou des fanes	moyenne à élevé
Mildiou des tubercules	moyenne
Gale commune	faible à moyenne
Gale poudreuse	moyenne
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	faible
Virus Y	faible
Sensibilité aux chocs	faible
Sensibilité à l'égermage	faible

4. Besondere Hinweise

Venezia hat eine ausgeprägte Keimruhe.

4. Remarques particulières

Venezia a une dormance prononcée.

Venezia ist eine frühe Sorte, die sich gut für Salzkartoffeln und Kartoffelsalat eignet.

Venezia est une variété précoce particulièrement appréciée en pommes de terre nature et en salade.

Kartoffeln

Speisesorte

Reifegruppe

Züchter

Abstammung

Aufnahme in die
Sortenliste

Vertreter

Victoria

mittelfrüh bis mittelspät/
mi-précoce à mi-tardive

ZPC Holland BV
NL-8300 BD Leuwarden

Agria × Ropta J 861

2002

Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/
*Association suisse des producteurs
de semences*
CH-1567 Delley

Pommes de terre

Variété de consommation

Maturité

Obtenteur

Ascendance

*Inscription
sur la liste suisse*

Représentant



1. Morphologische Merkmale

Knolle	Form:	lang- bis kurzoval
	Grösse:	gross
	Augen:	flach
	Fleischfarbe:	gelb
	Schale:	gelb
Stängel	mittelhoch, mittelaufrecht, violette Stängelbasis	
Blatt	graugrün	
Blüten	crème, mittel bis stark blühend	

1. Caractères morphologiques

Tubercule	forme:	oblongue à oblongue courte
	taille:	grosse
	yeux:	superficiels
	chair:	jaune
	peau:	jaune
Tige	de taille moyenne, port mi-dressé, violette à la base	
Feuille	gris-vert	
Fleur	crème, floraison moyenne à abondante	

2. Werteigenschaften

Ertrag:	hoch
Kalibrierbeute:	hoch
Stärkegehalt:	niedrig bis mittel (12-15,5%)
Stärkeertrag:	mittel
Kochtyp:	B
Verfärbung	
roh:	gering
gekocht:	gering
Reduzierende Zucker:	gering (0,16 bis 0,20%, TS)
Verarbeitungseignung:	Frites
Vorkeimdauer:	5 Wochen

2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement:	élevé
Calibre commercial:	élevé
Teneur en amidon:	moy. à faible (12-15,5%)
Rendement amidon:	moyen
Type culinaire:	B
Altération de la couleur	
chair crue:	faible
chair cuite:	faible
Sucres réducteurs	
(teneur):	faible (0,16 à 0,20%, MS)
Utilisation technologique:	frites
Prégermination:	5 semaines

3. Anfälligkeiten

Krebs:	nicht anfällig
Nematoden:	nicht anfällig (Pathotyp Ro ₁)
Krautfäule:	mittel
Braunfäule:	mittel
Flachschorf:	mittel bis stark
Pulverschorf:	hoch
Eisenfleckigkeit:	gering bis mittel
Blattroll:	mittel
Virus Y:	stark
Schlagempfindlichkeit:	gering bis mittel
Abkeimungs-empfindlichkeit:	mittel bis stark

3. Sensibilités

Galle verruqueuse:	résistante
Nématodes:	résistante au pathotype Ro ₁
Mildiou des fanes:	moyenne
Mildiou des tubercules:	moyenne
Gale commune:	moyenne à élevée
Gale poudreuse:	élevée
Taches de rouille:	faible à moyenne
Virus de l'enroulement:	moyenne
Virus Y:	élevée
Sensibilité aux chocs:	faible à moyenne
Sensibilité à l'égermage:	moyenne à élevée

4. Besondere Hinweise

Keimruhe ist ausgeprägt, Knollen lagern sich gut.

4. Remarques particulières

Victoria a une bonne dormance et se conserve bien.

Victoria ist eine mittelfrühe, eher grossfallende Speisesorte mit einer sehr vielseitigen Verwendungseignung für Frites, Kartoffelstock und Rösti.

Victoria est une variété mi-précoce à mi-tardive qui produit d'assez gros tubercules. Elle convient bien à la préparation de rösti, frites, pommes nature et pommes purée.

Farbtabelle für die Chips-Beurteilung

Farbverbindlich ist die Druckversion,
erhältlich unter kartoffel.ch/shop

NOTE 7




71 72 73 74

Table de référence pour la notation des chips


La version imprimée, disponible sur
patate.ch/shop, fait foi.

NOTE 6



61 62 63 64

NOTE 5



51 52 53 54

Color Scale for quality evaluation of Potato Chips

The printed version ist colour-binding, avilable at
kartoffel.ch/shop

NOTE 4



41 42 43 44